

# РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВНО ОСИГУРАЊЕ

## ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ КОЈА ЈЕ ПОСЛЕДИЦА ПОВРЕДЕ

- (1) Сходно члану 19. Посебних услова за колективно додатно осигурање за случај здравствене неспособности која је последица повреде, ова Табела се примењује за одређивање процента трајне здравствене неспособности која је последица повреде (у даљем тексту: Табела здравствене неспособности), и саставни је део Посебних услова и уговора о колективном осигурању за случај здравствене неспособности које је последица повреде
- (2) У осигурању лица за случај здравствене неспособности које је последица повреде код одређивања процента трајне здравствене неспособности примењује се искључиво проценат одређен овом Табелом здравствене неспособности.
- (3) Приликом примене одређених тачака из Табеле здравствене неспособности за једну последицу, примењује се на истим органима или екстремитетима она тачка која одређује највећи проценат, односно није дозвољена примена две тачке за исто функционално оштећење, односно последицу.
- (4) Ако је дефиницијом здравствене неспособности израженом кроз одређену тачку Табеле здравствене неспособности предвиђено да постоји више степена оштећења (разграниченог ознакама а, б, в, г), искључиво је право лекара цензора осигуравача да процени степен здравствене неспособности у оквиру дефинисане тачке.
- (5) Ако је дефиницијом здравствене неспособности израженом кроз одређену тачку Табеле здравствене неспособности предвиђен проценат неспособности у одређеном распону, искључиво је право лекара цензора осигуравача да утврди овај проценат према стручној процени у оквиру дефинисаног распона.
- (6) Субјективне тегобе у смислу смањења моторне мишићне снаге, болова и отока на месту повреде не узимају се у обзир при одређивању процента трајне здравствене неспособности.  
Индивидуалне способности, социјални положај или занимање (професионална способност) осигураника не узимају се у обзир при одређивању процента здравствене неспособности.

Уводна одредба

Субјективне тешкоће у смислу смањења моторне мишићне снаге, болова и отока на месту

повреде не узимају се у обзир при одређивању процента здравствене неспособности.

### I ГЛАВА

#### 1. Дифузне повреде мозга са клинички утврђеном сликом:

- декортација односно децеребрација;
- хемиплегија инветерираног типа са афазијом и агнозијом;
- деменција (Корсаковљев синдром);
- обострани Паркинсонов синдром са израженим ригором;
- комплетна хемиплегија, параплегија, триплегија, тетраплегија;
- епилепсија са деменцијом и психичком детериорацијом;
- психоза .. .....100 %

#### 2. Оштећење мозга са клинички утврђеном сликом:

- хемипареза са јако израженим спастичитетом;
- екстрапирамидална симптоматологија (немогућност координације покрета или постојање грубих нехотичних покрета);
- псеудобулбарна парализа са присилним плачем или смехом;
- оштећење малог мозга са израженим поремећајима равнотеже хода и координације покрета .....90 %

#### 3. Псеудобулбами синдром .....80 %

#### 4. Епилепсија са учесталим нападима и карактерним променама личности .....70 %

#### 5. Дифузне повреде мозга са клинички евидентираним последицама психоорганског синдрома:

а) у лаком степену до .....40 %  
б) у средњем степену .....50 %  
в) у јаком степену .....60 %

6. Хемипарезе или дисфазија:

а) у лаком степену .....30 %  
б) у средњем степену .....40 %  
в) у јаком степену .....50 %

7. Оштећење малог мозга са адиодохокинезом и асинерегијом.....40 %

8. Епилепсија са ретким нападима ..... 20 до 30 %

9. Контузионе повреде мозга:

а) постконтузиони синдром уз постојање објективног неуролошког налаза после болнички утврђене контузије мозга .....20 %  
б) оперисани интрацеребрални хематом без неуролошког испада .....20 %

10. Стање после трепанације свода лобање и/или лома базе лобање, рентгенолошки верифицирано .....10 %

11. Посткомоционални синдром после болнички односно медицински утврђене трауме мозга без постојања објективно неуролошког налаза до...10 %

Посебни услови:

1. За потресе мозга који нису болнички или медицински утврђени не одређује се трајна здравствена неспособност.
2. Сви облици епилепсије морају бити болнички утврђени уз примјену савремених дијагностичких метода.

За све случајеве из ове главе здравствена неспособност се одређује најраније 10 месеци после несрећног случаја.

12. Скалпирање власишта код мушкараца:

а) трећина површине власишта .....5 %  
б) половина површине власишта ..... 15 %  
в) читаво власиште .....30 %

13. Скалпирање власишта код жене:

а) трећина површине власишта .....10 %

б) половина површине власишта .....20 %  
в) читаво власиште .....40 %

II ОЧИ

14. Потпуни губитак вида на оба ока .....100 %

15. Потпуни губитак вида на једно око .....33 %

16. Ослабљење вида једног ока - за сваку десетину смањења.....3,33 %

17. У случају да је на другом оку вид ослабио за више од 3 десетине, за сваку десетину смањења вида повређеног ока одређује се.....6,66 %

18. Диплопија као трајна и репарабилна последица повреде ока до .....20 %

19. Губитак очног сочива:

а) афакија једнострана .....20 %  
б) афакија обострана .....30 %

20. Делимична оштећења мрежњаче и стакластог тела:

а) делимични испад видног поља као последица посттравматске аблације ретине .....5 %  
б) опациталес корпорис витреи као последица трауматског крварења у стакластом телу ока ...5 %

21. Мидријаза као последица директне трауме ока 5%

22. Непотпуна унутрашња офтальмоплегија .....10 %

23. Повреде сузног апарате и очних капака:

а) епифора .....5 %  
б) ентропиум, ектропиум .....5 %  
в) птоза капка .....5 %

24. Концентрично сужење видног поља на преосталом оку:

а) до 60 степени .....10 %  
б) до 40 степени .....30 %  
в) до 20 степени .....50 %  
д) до 5 степени .....60 %

25. Једнострano концентрично сужење видног поља:

а) до 50 степени ..... 5 %  
б) до 30 степени ..... 15 %  
в) до 5 степени ..... 30 %

26. Хомонимна хемијанопсија ..... 30 %

### III УШИ

27. Потпуна глувоћа на оба уха са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног орга ..... 40 %

28. Потпуна глувоћа на оба уха са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа ..... 60 %

29. Ослабљен вестибуларни орган са уредним слухом ..... 5 %

30. Потпуна глувоћа на једном уху:

а) са уредном калоричком реакцијом вестибуларног органа ..... 15 %  
б) са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа на том уху ..... 20 %

31. Обострана наглавост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Фоввлер- Сабине:

а) 20 до 30 % ..... 5 %  
б) 31 до 60 % ..... 10 %  
в) 61 до 85 % ..... 20 %

32. Обострана наглавост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Фоввлер- Сабине:

а) 20 до 30 % ..... 10 %  
б) 31 до 60 % ..... 20 %  
в) 61 до 85 % ..... 30 %

33. Једнострана тешка наглавост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела ..... 10 %

34. Једнострана тешка наглавост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела ..... 2,5 %

35. Повреда ушне школьке:

а) делимичан губитак или делимична деформација ..... 5 %  
б) потпуни губитак или потпуна деформација ..... 10 %

### IV ЛИЦЕ

36. Ожиљно деформирајућа оштећења на лицу праћена функционалним сметњама и/или посттравматска повреда лица:

а) у лаком степену ..... 5 %  
б) у средњем степену ..... 10 %  
в) у јаком степену ..... 25 %

Посебни услови:

За козметичке и естетске ожильке или друге промене на лицу не одређује се трајна здравствена неспособност.

37. Ограничено отварање уста:

а) размак горњих и доњих зуба до 4 цм ..... 5 %  
б) размак горњих и доњих зуба до 3 цм ..... 15 %  
в) размак горњих и доњих зуба до 1,5 цм ..... 30 %

38. Дефекти на чељусном скелету, на језику или непцу са функционалним сметњама:

а) у лаком степену ..... 10 %  
б) у средњем степену ..... 20 %  
в) у јаком степену ..... 30 %

За случајеве под тачкама 36., 37. и 38. нарушавање здравља се одређује после завршеног лечења, али не раније од 6 месеци после повреде.

39. Губитак сталних зуба:

а) од 16 за сваки зуб ..... 1 %  
б) од 17 или више за сваки зуб ..... 1,5 %

40. Пареза фацијалног живца после фрактуре слепоочне кости или повреде одговарајуће паротидне регије:

а) у лаком степену до ..... 10 %  
б) у средњем степену ..... 15 %  
в) у јаком степену са контрактуром и тиком мимичке мускулатуре ..... 20 %  
д) парализа фацијалног живца ..... 30 %

Трајна здравствена неспособност се одређује после завршеног лечења али не раније од 1 године после повреде.

## V НОС

### 41. Повреде носа:

- а) губитак чула мириса.....10 %
- б) делимичан губитак носа до ..... 15 %
- в) губитак читавог носа .....30 %

42. Аносмија као последица верифициране фрактуре горњег унутрашњег дела носног скелета .....5 %

### 43. Промена облика пирамиде носа:

- а) у лаком степену до .....10 %
- б) у средњем степену ..... 15 %
- в) у јаком степену .....20 %

44. Отежано дисање услед фрактуре носног септума, која мора бити утврђена клинички и рентгенолошки непосредно после повреде.....5 %

## VI ДУШНИК И ЈЕДЊАК

### 45. Повреде душника:

- а) стање после трахеотомије код виталних индикација после повреде.....5 %
- б) губитак чула укуса .....5 %
- в) стенозе душника после повреде гркљана и почетног дела душника .....10 %

46. Стеноза душника, због које осигураник мора трајно носити канилу.....60 %

### 47. Трајна органска промуклост због повреде:

- а) слабијег интензитета..... 5 %
- б) јачег интензитета..... 15 %
- в) потпуни губитак гласа .....30 %

### 48. Сужење једњака:

- а) лаком степену.....10 %
- б) у средњем степену.....20 %
- в) у јаком степену.....30 %

49. Потпуно сужење једњака са гастростомом...80 %

## VII ГРУДНИ КОШ

50. Прелом од најмање два ребра, ако је зацелjen са дислокацијом или прелом стернума ако је зацелjen са дислокацијом до .....10 %

51. Оперативни ожилјак после отварања грудне шупљине до .....10 %

52. Смањење плућне функције услед серијског прелома ребара или пенетрантних повреда грудног коша, посттрауматских атхезија или услед рестриктивних сметњи:

- а) за 20 до 30 %..... 15 %
- б) за 31 до 50 %.....30 %
- в) за 51 или више % .....45 %

53. Фистула након емпиема..... 15 %

54. Хронични плућни апсцес.....30 %

### Посебни услови:

1. Капацитет плућа се одређује поновљеном спирометријом, а по потреби и детаљном пулмолоском обрадом и ергометријом.
2. Ако су стања из тачке 50., 51., 53. и 54. праћена поремећајем плућне функције рестриктивног типа, онда се не цене по наведеним тачкама, већ по тачки 52.

### 55. Губитак једне дојке:

- а) до 50 година живота .....10 %
- б) преко 50 година живота .....5 %
- в) тешко оштећење дојке до 50 година живота....5 %

### 56. Губитак обе дојке:

- а) до 50 година живота .....30 %
- б) преко 50 година живота ..... 15 %
- в) тешко оштећење дојке до 50 година живот ...10 %

### 57. Последице пенетрантних повреда срца и великих крвних судова грудног коша:

- а) срце са нормалним електрокардиограмом...30 %
- б) са промењеним електрокардиограмом према тежини промене до .....60 %
- в) крвни судови ..... 15 %
- д) анеуризма аорте са имплантатом.....40 %

### 58. Дубљи ожилјци на телу после опекотина или повреда без сметњи мотилитета а захватај:

а) до 10 % површине тела до.....10 %  
б) преко 10 % површине тела до .....20 %

59. Дубоки ожилјци на телу после опекотина или повреда, а захватају:

а) до 10 % површине тела до.....10 %  
б) до 20 % површине тела до .....20 %  
в) преко 20 % површине тела .....30 %

Посебни услови:

1. Случајеви из тачке 58. и 59. израчунавају се применом правила деветке.  
2. Функционалне сметње изазване опекотинама или повредама из тачке 59. оцењују се и према одговарајућим тачкама из Табеле.

#### VIII ТРБУШНИ ОРГАНИ

60. Трауматска хернија - верификована у болници или здравственој установи непосредно после повреде, ако је истовремено била поред херније клинички верификована повреда меких делова трбушног зида у том подручју .....10 %

61. Повреде дијафрагме:

а) стање након прскања дијафрагме у болници непосредно после повреде верификовано и хируршки забринуто .....20 %  
б) дијафрагмална хернија - рецидив након хируршки забринуте дијафрагмалне трауматске киле .....30 %

62. Постоперативна хернија после лапаротомије до .....20 %

63. Оперативни ожилјак после лапаротомије....5 %

64. Повреда црева и/или јетре, слезине, желуца:  
а) са шивењем..... 15 %

б) повреда црева и/или желуца са ресекцијом .....20 %  
в) повреда јетре са ресекцијом.....30 %

65. Губитак слезине (Спленцетомија):

а) до 20 година живота .....25 %  
б) преко 20 година живота .....20 %

66. Повреда гуштераче према функционалном оштећењу до .....20 %

67. Анус праетернатуралис:

а) танког црева .....60 %  
б) дебелог црева .....50 %

68. Фистула стерцоралис .....40 %

69. Трајни пролапсус реци .....20 %

70. Инционтенција алви:

а) Делимична до .....50 %  
б) потпуна .....80 %

#### IX МОКРАЋНИ ОРГАНИ

71. Губитак једног бубрега - уз нормалну функцију другог .....30 %

72. Губитак једног бубrega уз оштећење функције другог:

а) у лаком степену до 30 % оштећења функције .....40 %  
б) у средњем степену до 50 % оштећења функције .....55 %  
в) у јаком степену преко 50 % оштећења функције до .....80 %

73. Функционална оштећења једног бубрега:

а) у лаком степену до 50 % оштећења функције .....15 %  
б) у јаком степену преко 50 % оштећења функције .....20 %

74. Функционалне Последице оштећења оба бубрега:

а) у лаком степену.....30 %  
б) у јаком степену .....60 %

75. Поремећај испуштања мокраће услед повреде уретре, градулирано по Цхавиер-у:

а) у лаком степену испод 18 цх .....10 %  
б) у средњем степену испод 14 цх .....20 %  
в) у јаком степену испод 6 цх .....35 %

76. Потпуна инцонтинентија урина:

- а) код мушкарца ..... 50 %  
б) код жене ..... 70 %

77. Уринарна фистула:

- а) уретрална ..... 20 %  
б) перинаелна или вагинална ..... 40 %

78. Повреда мокраћног међура са смањеним капацитетом за сваку 1/3 смањења капацитета ..... 10 %

#### Х МУШКИ И ЖЕНСКИ ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

79. Губитак једног тестиса до 60 година живота ..... 15 %

80. Губитак једног тестиса преко 60 година живота ..... 5 %

81. Губитак оба тестиса:

- а) до 60 година живота ..... 50 %  
б) преко 60 година живота ..... 30 %

82. Губитак пениса до 60 година живота ..... 50 %

83. Губитак пениса преко 60 година живота ..... 30 %

84. Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом до 60 година живота ..... 50 %

85. Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом преко 60 година живота ..... 30 %

86. Губитак материце и јајника до 55 година живота:

- а) губитак материце ..... 30 %  
б) за губитак једног јајника ..... 10 %  
в) за губитак оба јајника ..... 30 %

87. Губитак материце и јајника преко 55 година живота:

- а) губитак материце ..... 10 %  
б) за губитак сваког јајника ..... 5 %

88. Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију до 60 година живота ..... 50 %

89. Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију преко 60 година живота ..... 15 %

#### XI КИЧМА

90. Повреда кичме са трајним оштећењем мождине, или периферног нервног система (тетраплегија, триплегија, параплегија) са губитком контроле дефекације и уринирања ..... 100 %

91. Повреда кичме са трајним оштећењем мождине или периферног нервног система (тетрапареза, трипареза) са очуваном контролом дефекације и уринирања ..... 90 %

92. Повреда кичме са потпуном парализом доњих екстремитета без сметњи дефекације и уринирања ..... 90 %

93. Повреда кичме са парезом доњих екстремитета:

- а) у лаком степену до ..... 30 %  
б) у средњем степену ..... 40 %  
в) у јаком степену ..... 50 %

94. Смањена покретљивост кичме услед прелома најмање два пршљена уз промену кривуље кичме (кифоза, гибус, сколиоза):

- а) у лаком степену до ..... 20 %  
б) у средњем степену ..... 30 %  
в) у јаком степену ..... 40 %

95. Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела цервикалног сегмента:

- а) у лаком степену до ..... 10 %  
б) у средњем степену ..... 20 %  
в) у јаком степену ..... 30 %

96. Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела торакаралног сегмента:

- а) у лаком степену ..... 5 %  
б) у средњем степену ..... 10 %  
в) у јаком степену ..... 20 %

97. Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела лумбалног сегмента:

- а) у лаком степену до ..... 15 %  
б) у средњем степену ..... 25 %

в) у јаком степену .....	35 %
98. Серијски прелом 3 или више спиналних наставака кичме.....	5 %
99. Серијски прелом 3 или више попречних наставака кичме до .....	10 %

Посебни услови:

Херниа дисци интервертебралис, све врсте лумбагија, дископатија, спондилоза, спондилолистеза, спондилолиза, сакралгија миофасцитиса, кокцигодинија, исхиалгија, фиброзитиса, фасцитиса и све патоанатомске промене слабинско крстне регије означене аналогним терминима, нису обухваћене осигурањем.

## XII КАРЛИЦА

100. Вишеструки прелом карлице уз тежу деформацију или денивелацију сакроилијакалних зглобова или симфизе .....	30 %
101. Симфизеолиза са дислокацијом хоризонталном и/или вертикалном:	
а) величине 1 цм .....	10 %
б) величине 2цм .....	15 %
в) величине преко 2цм .....	25 %
102. Прелом једне цревне кости саниран уз дислокацију .....	10 %
103. Прелом обе цревне кости саниран уз дислокацију .....	15 %
104. Прелом седне или стидне кости саниран уз дислокацију .....	10 %
105. Паралелни прелом двије стидне или седне кости саниран уз дислокацију .....	15 %
106. Прелом крстачне кости саниран уз дислокацију .....	15 %
107. Тртична кост:	
а) прелом тртичне кости саниран са дислокацијом, или оперативно одстрањен одломљени фрагмент .....	5 %
б) оперативно одстрањена тртична кост .....	10 %

Посебни услови:

За преломе костију карлице који су санирани без дислокације и без објективних функционалних сметњи не одређује се трајна здравствена неспособност.

## XIII РУКЕ

108. Губитак обе руке или шаке .....	100 %
109. Губитак руке у рамену (ексартиулација)...	70 %
110. Губитак руке у подручју надлактице .....	65 %
111. Губитак руке испод лакта са очуваном функцијом лакта .....	60 %
112. Губитак шаке .....	55 %
113. Губитак свих прстију на обе шаке .....	90 %
114. Губитак палца .....	20 %
115. Губитак кажипрста .....	12 %
116. Губитак средњег, домалог и малог прста:	
а) средњег .....	9 %
б) домалог или малог, за сваки прст .....	6 %
117. Губитак метакарпалне кости палца .....	6 %
118. Губитак метакарпалне кости кажипрста .....	4 %
119. Губитак метакарпалне кости средњег, домалог или малог прста, за сваку .....	3 %

Посебни услови:

За губитак једног чланка палца одређује се половина, а за губитак једног чланка осталих прстију одређује се трећина процента одређеног за дотични прст.

За губитак јагодице прста одређује се 1/2 процента одређеног за губитак чланка.

Делимичан губитак коштаног дела чланка, оцењује се као потпуни губитак чланка.

## XIV НАДЛАКТИЦА

120. Анкилоза раменог зглоба у функционално неповољном положају (абдукција) .....	35 %
---	------

121. Анкилоза раменог зглоба у функционално повољном положају (абдукција) .....25 %
122. Умањена покретљивост руке у раменом зглобу:
- а) у лаком степену до .....10 %
  - б) у средњем степену .....20 %
  - ц) јаком степену .....30 %
123. Хабитално ишчашење раменог зглоба које се верифицирано често јавља .....20 %
124. Лабавост раменог зглоба са коштаним дефектом зглобних тела .....35 %
125. Кључна кост:
- а) неправилно зарастао прелом кључне кости ...5 %
  - б) псевдоартроза кључне кости .....10 %
126. Дјелимично ишчашење (сублуксација) акромиокла-викуларног или стерноклавикуларног зглоба без умањене покретљивости .....5 %
127. Потпуно ишчашење акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног зглоба .....10 %
128. Ендопротеза раменог зглоба .....30 %
129. Псевдоартроза надлактичне кости .....30 %
130. Хронични остеомиелитис костију горњих екстремитета са фистулом .....10 %
131. Парализа живца ацесоријуса .....15 %
132. Парализа брахијалног плексуса .....60 %
133. Делимична парализа брахијалног плексуса (Ерб или Клумпке).....35 %
134. Парализа аксиларног живца .....15 %
135. Парализа радијалног живца .....30 %
136. Парализа живца медиануса .....35 %
137. Парализа живца улнариса .....30 %
138. Парализа два живца једне руке .....50 %
139. Парализа три живца једне руке .....60 %

Посебни услови:

За парезу живаца одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве који спадају под тачке 131. до 139. одређује се трајна здравствена неспособност завршеног лечења, али не пре 2 године после незгоде.

#### XV ПОДЛАКТИЦА

140. Анкилоза зглоба лакта у функционално повољном положају од 100 до 140 .....20 %
141. Анкилоза зглоба лакта у функционално неповољном положају .....30 %
142. Умањена покретљивост зглоба лакта:
- а) у лаком степену до .....10 %
  - б) у средњем степену .....15 %
  - в) у јаком степену .....20 %
143. Расклимиани зглоб лакта:
- а) у лаком степену до .....10 %
  - б) у средњем степену .....20 %
  - в) у јаком степену .....30 %
144. Ендопротеза лакта .....25 %
145. Псевдоартроза обе кости подлактице .....30 %
146. Псевдоартроза радиуса .....15 %
147. Псевдоартроза улне .....15 %
148. Анкилоза подлактице у супинацији .....25 %
149. Анкилоза подлактице у средњем положају 15 %
150. Анкилоза подлактице у пронацији .....20 %
151. Умањена пронација и супинација подлактице:
- а) у лаком степену .....5 %
  - б) у средњем степену .....10 %
  - в) у јаком степену .....15 %
152. Анкилоза ручног зглоба:

а) у дорзалној екстензији ..... 15 %  
б) у продужењу осовине подлактице ..... 20 %  
в) у воларној флексији ..... 30 %

153. Умањена покретљивост ручног зглоба:

а) у лаком степену до ..... 10 %  
б) у средњем степену ..... 15 %  
в) у јаком степену ..... 20 %

154. Ендопротеза чунасте кости и/или лунарне кости ..... 20 %

155. Ендопротеза ручног зглоба ..... 25 %

Посебни услови:

Псевдоартроза чунасте и/или лунарне кости се оцењује према тачки 153.

XVI ПРСТИ

156. Анкилоза свих прстију једне руке ..... 40 %

157. Анкилоза читавог палца ..... 15 %

158. Анкилоза читавог кажипрста ..... 9 %

159. Потпуна укоченост средњег, домалог и малог прста:

а) читавог средњег прста ..... 6 %  
б) домалог или малог прста, за сваки ..... 4 %

Посебни услови:

1. За потпуну укоченост једног зглоба палца одређује се 1/2, а за потпуну укоченост једног зглоба осталих прстију одређује се 1/3 процента одређеног за губитак тог прста.

2. Збир процената за угроженост појединих зглобова једног прста не може бити већи од процента одређеног за потпуну укоченост тог прста.

160. Умањена покретљивост палца после уредно зацеленог Бенетовог прелома ..... 5 %

161. Неправилно зацелен Бенетов прелом палца ..... 10 %

162. Прелом метакарпаланих костију:

а) неправилно зарастао прелом метакарпаланих кости ..... 4 %

б) за остале метакарпалане кости II, III, IV и V-е за сваку кост ..... 3 %

163. Умањена покретљивост дисталног или базалног зглоба палца:

а) у лаком степену ..... 3 %  
б) у јаком степену ..... 6 %

164. Умањена покретљивост поједињих зглобова кажипрста:

а) у лаком степену за сваки зглоб ..... 2 %  
б) у средњем степену за сваки зглоб ..... 3 %  
в) у јаком степену за сваки зглоб ..... 4 %

165. Умањена покретљивост поједињих зглобова:

А) средњег прста:

а) у лаком степену за сваки зглоб ..... 1,5 %  
б) у средњем степену за сваки зглоб ..... 2 %  
в) у јаком степену за сваки зглоб ..... 3 %

Б) домалог или малог прста:

а) у лаком степену за сваки зглоб ..... 1 %  
б) у средњем степену за сваки зглоб ..... 2 %  
в) у јаком степену за сваки зглоб ..... 3 %

Посебни услови:

За различите последице на истом зглобу не сабирају се проценти по појединим тачкама, а трајна здравствена неспособност се одређује само по оној тачки која одређује највећи проценат. Укупан проценат трајне здравствене неспособности по тачки 163., 164. и 165. не може износити више од процента за потпуну анкилозу дотичног прста.

XVII НОГА

166. Губитак обе надколенице ..... 100 %

167. Ексартикулација ноге у куку ..... 70 %

168. Губитак надколенице у горњој трећини, ако је батрљак неподесан за протезу ..... 60 %

169. Губитак надколенице испод горње трећине ..... 50 %

170. Губитак обе подколенице, ако су батрљци подешени за протезу ..... 80 %

171. Губитак подколенице, батрљак испод 6 цм .....	50 %	188. Псеудоартроза врата бедрене кости са скраћењем ноге .....	45 %
172. Губитак подколенице, батрљак преко 6 цм .....	40 %	189. Деформирајућа артроза кука уз смањену покретљивост кука:	
173. Губитак оба стопала .....	80 %	а) у лаком степену до .....	15 %
174. Губитак једног стопала .....	35 %	б) у средњем степену .....	25 %
175. Губитак стопала у Џхопартовој линији .....	35 %	ц) у јаком степену .....	35 %
176. Губитак стопала у Лисфранцовој линији ....	30 %	190. Ендопротеза кука .....	30 %
177. Трансметатарзална ампутација .....	25 %	191. Умањена покретљивост кука без знакова деформирајуће артрозе:	
178. Губитак I или V метатарзалне кости .....	5 %	а) у лаком степену до .....	10 %
179. Губитак II, III, IV метатарзалне кости-за сваку .....	3 %	б) у средњем степену .....	15 %
180. Губитак свих прстију стопала на једној нози .....	20 %	в) у јаком степену .....	25 %
181. Губитак палца на стопалу:		192. Псеудоартроза бедрене кости .....	40 %
а) губитак крајњег чланка палца .....	5 %	193. Неправилно зацељен прелом бедрене кости уз ангулацију за:	
б) губитак целог палца .....	10 %	а) 10 до 20 степени до .....	10 %
182. Губитак читавог II-V прста на нози-за сваки прст .....	2,5 %	б) преко 20 степени .....	15 %
183. Делимични губитак II-V прста на нози -за сваки прст .....	1 %	194. Хронични остеомиелитис са фистулом ....	10 %
Посебни услови:		195. Велики дубоки ожилци у мишићима надколенице или подколенице, као и трауматске херније мишића надколенице и подколенице, без поремећаја функције зглоба до .....	10 %
Укоченошт ининтерфалангеалних зглобова II-V прста у испруженом положају или умањена покретљивост ових зглобова не представља нарушење здравља.		196. Циркулаторне промене после оштећења великих крвних судова доњих екстремитета:	
XVIII БЕДРО		а) подколенице до .....	10 %
184. Анкилоза кука у функционално повољном положају .....	30 %	б) надколенице до .....	20 %
185. Анкилоза кука у функционално неповољном положају .....	40 %	197. Скраћење ноге због прелома:	
186. Анкилоза оба кука .....	70 %	а) за 2 до 4 цм до .....	10 %
187. Нерепонирано застарело ишчашење кука .....	40 %	б) за 4,1 до 6 цм .....	15 %
		в) преко 6 цм .....	20 %
XIX ПОДКОЛЕНИЦА		198. Анкилоза колена:	

а) у функционално повољном положају до 10 степени флексије .....	25 %	а) за 5 до 15 степени .....10 % б) преко 15 степени .....20 %
б) у функционално неповољном положају .....35 %		
199. Деформирајућа артроза колена после повреде зглобних тела уз умањену покретљивост са рентгенолошком верификацијом:		
а) у лаком степену од 91 до 135 степени до .... 15 % б) у средњем степену од 46 до 90 степени .....25 % в) у јаком степену од 0 до 45 степени .....35 %		
200. Умањена покретљивост зглоба колена:		
а) у лаком степену од 91 до 135 степени до ....10 % б) у средњем степену од 46 до 90 степени ..... 15 % ц) у јаком степену од 0 до 45 степени .....20 %		
201. Умањена флексија колена за мање од 15 степени .....	5 %	211. Анкилоза скочног зглоба у функционално повољном положају (5 до 10 степени плантарне флексије) .....20 %
202. Расклиманост колена после повреда капсуле или лигаментарног апаратса, поређена са здравим коленом:		
а) лабавост у једном правцу до .....10 % б) лабавост у два правца ..... 15 % в) стално ношење ортопедског апаратса .....30 %		
203. Оштећење менискуса са рецидивирајућим сметњама или стање после оперативног одстрањења менискуса .....5 %		212. Анкилоза скочног зглоба у функционално неповољном положају.....25 %
204. Ендопротеза колена .....30 %		213. Умањена покретљивост скочног зглоба:
205. Слободно зглобно тијело до .....10 %		а) у лаком степену до .....10 % б) у средњем степену..... 15 % в) у јаком степену .....20 %
206. Функционалне сметње после одстрањења пателе:		
а) парцијално одстрањена патела .....5 % б) тотално одстрањена патела ..... 15 %		214. Умањена покретљивост стопала у једном правцу за мање од 10 степени .....5 %
207. Псеудоартроза пателе .....10 %		215. Ендопротеза скочног зглоба .....25 %
208. Рецидивирајући трауматски синовитис колена и/или трауматска цхондромалација пателе .....10 %		216. Неправилно зацељен прелом малеола уз проширење малеола ме виљушке .....20 %
209. Псеудоартроза тибије .....30 %		217. Деформација стопала: пес еихцаватус, пес плановалгус, пес еquinus, пес варус:
210. Неправилно зацељен прелом подколенице уз валгус, варус или рецурутус деформацију:		а) у лаком степену до .....10 % б) у јаком степену .....20 %
		218. Деформација цалџанеуса после компресивног прелома до .....20 %
		219. Деформација талуса после прелома уз деформирајућу артрозу до .....20 %
		220. Изолирани преломи тарзалних костију без веће деформације .....5 %
		221. Деформација једне метатарзалне кости после прелома за сваку (укупно не више од 10 %) .....3 %
		222. Већа деформација метатарзуса после прелома метатарзалних костију до ...10 %
		223. Анкилоза крајњег зглоба палца на нози ..2,5 %
		224. Анкилоза основног или оба зглоба палца на нози ..... 5 %
		225. Анкилоза основног зглоба II-V прста - за сваки прст .....1 %

226. Деформација или анкилоза II-V прста - у савијеном положају (дигитус флексус) - за сваки прст .....1,5 %

227. Велики ожилъци на пети или табану после дефекта неких тела:

а) површина до 1/2 табана до .....10 %  
б) површина преко 1/2 табана до .....20 %

228. Парализа исхијадичког живца .....40 %

229. Парализа феморалног живца .....30 %

230. Парализа тибијалног живца .....25 %

231. Парализа перонеалног живца .....25 %

232. Парализа глуеталног живца .....10 %

Посебни услови:

За парезу живаца на нози одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве наведене у тачкама

228. до 232. одређује се трајна здравствена неспособност после завршеног лечења, али не раније од 2 године после повреде.

#### ПРОЦЕНА ОПЕЧЕНЕ ПОВРШИНЕ ПО WALLACE-ОВОМ ПРАВИЛУ

Правило деветке:

- врат и глава .....9 %
- једна рука .....9 %
- предња страна трупа .....2 x 9 %
- задња страна трупа .....2 x 9 %
- нога .....2 x 9 %
- перинеум и гениталије.....1 %

59013.02/16