

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ХЕМАТОЛОГИЈИ

3 БОЛЕСТИ КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА И ПОРЕМЕЋАЈИ КОЈИ ЗАХВАТАЈУ ИМУНИ СИСТЕМ

0302 ТРАНСФУЗИЈА КРВИ

Трансфузије крви и крвних производа шифрирају се увек када су урађене. Вишеструко давање истих крвних производа у истој епизоди лечења треба шифрирати **само једном шифром** процедуре. Ако се даје више од једног типа производа крви за време једне епизоде лечења, потребно је доделити одговарајуће шифре.

ПРИМЕР:

Пацијент је примио трансфузију еритроцита 3 пута за време једне исте епизоде лечења.

Шифра: 13706-02[1893] *Трансфузија еритроцита*

Напомена: Потребно је само једном уписати шифру.

ПРИМЕР:

Пацијент је примио трансфузију еритроцита и гама глобулина.

Шифре: 13706-02 [1893] *Трансфузија еритроцита*
13706-05 [1893] *Трансфузија гама глобулина*

Напомена: Потребно је шифрирати сваку процедуру појединачно.

0303 АБНОРМАЛНИ КОАГУЛАЦИОНИ ПРОФИЛ ЗБОГ АНТИКОАГУЛАНАТА

Пацијенти који користе антикоагуланте често захтевају пријем у болницу (или могу да имају продужен боравак у болници):

- преоперативно или постоперативно да би се пратили нивои антикоагуланата (варфарин, хепарин, клексан или фрагмин)
- када одређени ниво антикоагуланата не контролише стање
- када ниво антикоагуланата захтева прилагођавање

У овим случајевима потребно је доделити шифру Z92.1 *Лична анамнеза о дуготрајној (текућој) употреби антикоагулантних средстава пратећој дијагнози.*

ПРИМЕР:

Пацијент на дуготрајној терапији антикоагулантима, примљен је један дан пре трансуретралне ресекције простате, због хепаринизације.

Шифра: Z92.1 *Лична анамнеза о дуготрајној (текућој) употреби антикоагулантних средстава (као пратећа дијагноза)*

Када је пацијент примљен због абнормалног профила коагулације потребно је доделити шифру D68.3 *Хеморагијски поремећај због циркулишућих антикоагуланата*, чак и ако се хеморагија није догодила.

ПРИМЕР: (видети такође правило 1902 *Нежељена дејства*)

Пацијент који је на варфарину због атријалне фибрилације, примљен је у болницу због епистаксе настале услед токсичности варфарина.

Шифре: R04.0 *Крварење из носа*
D68.3 *Крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку*
Y44.2 *Нежељени ефекти антикоагуланата у терапијској употреби*

ПРИМЕР: (Видети такође Поглавље 1901 *Тровање*)

Пацијент је примљен у болницу јер је узео непримерену дозу варфарина што је резултирало токсичним ефектима.

Шифре: T45.5 *Тровање антикоагулантима*
D68.3 *Крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку*
X44 *Случајно тровање и излагање другим неозначеним лековима, препаратима и биолошким супстанцама*

ПРИМЕР:

Мушкарац старости 80 година, примљен је због хроничне опструктивне болести плућа. У личној анамнези наводи да је имао замену аортне валвуле и да је на дуготрајној терапији варфарином. На пријему је откривено да је пацијент узимао прекомерну дозу варфарина. Варфарин је обустављен и дат је витамин К 5мг *per os*.

Шифре: J44.9 *Хронична опструктивна болест плућа, неозначено*
D68.3 *Крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку*
Y44.2 *Нежељени ефекти антикоагуланата у терапијској употреби*

У случају дубоке венске тромбозе, плућног емболизма, можданог удара итд. због премале дозе варфарина, потребно је доделити прво шифру за стање а онда Z92.1 *Лична анамнеза о дуготрајној (текућој) употреби антикоагулантних средстава*.

ПРИМЕР:

Пацијент са дубоком венском тромбозом, који узима варфарин у последње две године, примљен је због *bypass* реваскуларизације (CABG). Отпуст је одложен док *INR* није стабилизван постоперативно.

Шифре: Z92.1 *Лична анамнеза о дуготрајној употреби антикоагулантних средстава.*

0304**ПАНЦИТОПЕНИЈА**

Када је утврђена панцитопенија без других објашњења, тада је потребно доделити шифру D61.9 *Апластична анемија, неозначена*. Ова шифра се додељује само када је панцитопенија документована а када нису наведене специфичне абнормалности крви (анемија, неутропенија и тромбоцитопенија).