

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	232.90	20 mg	15.53	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122866	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	99.10	40 mg	14.16	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d.; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	119.40	40 mg	8.53	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Krika, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemačka	99.10	40 mg	14.16	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krika, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemačka	198.30	40 mg	14.16	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krika, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	119.40	40 mg	8.53	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krika, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	238.90	40 mg	8.53	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122500	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	99.10	40 mg	14.16	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122502	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	119.40	40 mg	8.53	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.
1122764	A02BC04	rabeprazol	GASTROPRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 10mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD, Adoc d.o.o. Beograd	Bugarska; Republika Srbija	218.90	20 mg	31.27	90%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gorње endoskopije.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122765	A02BC04	rabeprazol	GASTROPRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Adoc d.o.o. Beograd	Bugarska; Republika Srbija	339.10	20 mg	24.22	90%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	151.40	30 mg	16.22	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	302.80	30 mg	16.22	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	230.50	30 mg	12.35	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	460.90	30 mg	12.35	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
2127451	A05BA..	ornitinaspartat	HEPA-MERZ	granule za oralni rastvor	kesica, 30 po 3g	Merz Pharma GmbH&Co. KGaA	Nemačka	3.445.00	-	-	75%	Portosistemske encefalopatije (K72).	Lek se u uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127425	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	439.50	6,7 g	8.83	15%	1.Portosistemske encefalopatije ( K72 ). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	688.10	1,5 g	206.43	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 1g	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.225.50	1,5 g	183.83	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 50 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.754.30	1,5 g	105.26	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129477	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 100 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.508.60	1,5 g	105.26	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129478	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 50 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.785.50	1,5 g	113.57	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129479	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 100 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	7.571.00	1,5 g	113.57	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.455.30	1,5 g	87.32	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.910.70	1,5 g	87.32	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 400 mg	Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska	Slovenija	2.055.30	1,5 g	77.07	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2.889.00	1,5 g	86.67	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorija	blister, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3.436.70	1,5 g	184.11	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129501	A07EC02	mesalazin	PENTASA	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 60 po 2 g	Ferring GmbH	Nemačka	7.809.00	1,5 g	97.61	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129500	A07EC02	mesalazin	PENTASA	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 30 po 4 g	Ferring GmbH	Nemačka	8.449.50	1,5 g	105.62	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1043005	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	189.60	2 g	12.64	25%		
1043003	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	94.80	2g	12.64	25%		
1043001	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 750 mg	Merck S.L.; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA; Famar Lyon	Španija; Francuska; Nemačka; Francuska	248.50	2g	22.09	60%		
1043000	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA; Famar Lyon	Francuska; Nemačka; Francuska	329.20	2 g	21.95	60%		
1042063	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	331.60	60 mg	11.05	65%		
1042030	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	255.10	60 mg	8.50	50%		
1042028	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	332.00	60 mg	7.38	60%		
1042029	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	663.90	60 mg	7.38	60%		
1042050	A10BB09	gliklazid	DIACLIDE MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Modermott Laboratories Limited; T/a Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT	Irska; Madarska	255.10	60 mg	8.50	50%		
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	398.70	30 mg	26.58	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	398.70	30 mg	26.58	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija) -metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	797.50	30 mg	26.58	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	797.50	30 mg	26.58	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija) -metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341035	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	811.30	0.1g	57.95	80%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341036	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.086.50	0.1g	38.80	80%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1050100	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 50 po 0,25 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	547.40	1 mcg	43.79	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa ( E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza ( M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050102	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 0,5 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	538.40	1 mcg	35.89	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa ( E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza ( M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050101	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 1 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	1.004.60	1 mcg	33.49	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa ( E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza ( M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.567.10	1 mcg	62.68	25%	Renalna osteodistrofija ( N25.0 ).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
2050087	A11CC05	holekalciferol	VIGANTOL ULJJE	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapajkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)	Lusomedicamenta Sociedade Technica Farmaceutica S.A.	Portugalija	228.50	20 mcg	0.91	50%		
1063221	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL UNION	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	182.70	5 mg	7.61	45%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068220	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	film tableta	28 po 75 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	492.20	75 mg	17.58	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068502	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Krka- Farma d.o.o.; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Hrvatska; Slovenija	492.20	75 mg	17.58	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068221	B01AC04	klopidogrel	ANTIAGREX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Actavis LTD	Malta	492.20	75 mg	17.58	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068239	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	492.20	75 mg	17.58	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068551	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDIX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	492.20	75 mg	17.58	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068030	B01AC04	klopidogrel	CLOPICOR	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Actavis LTD	Malta	492.20	75mg	17.58	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068520	B01AC30	klopidogrel, acetilsalicilna kiselina	DUOPLAVIN	film tableta	blister, 28 po (75 mg + 100 mg)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	1.264.60	1 tableta	45.16	60%	1. Prevencija aterotrombotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta miokarda. 2. Kod bolesnika sa anginom pektorisa i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobađanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.	
1060140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrda	blister, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	328.70	0.2 g	19.06	15%		
1060075	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	tableta za žvakanje	blister, 30 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	408.70	90 mg	12.26	15%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1101422	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 50 mg	Laboratorios Liconsa S.A.	Španija	723.60	0,2 g	48.24	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijski flater i atrijska tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1101423	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 100 mg	Laboratorios Liconsa S.A.	Španija	1.207.30	0,2 g	40.24	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijski flater i atrijska tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1101425	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 200 mg	Laboratorios Liconsa S.A.	Španija	2.896.40	0,2 g	48.27	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijski flater i atrijska tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
7102621	C01DA02	gliceritritrat (nitroglicerini)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej	boca sa pumpom za doziranje, 14,4 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza)	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	564.20	2,5 mg	17.63	75%		
7102651	C01DA02	gliceritritrat	GLYTRIN	sublingvalni sprej, rastvor	bočica sa ventilom, 200 doza (400 mcg/dozi)	Pharmaserve North West Limited	Velika Britanija	564.20	2,5 mg	17.63	75%		
1109100	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	PharmaS d.o.o.; PharmaS d.o.o.	Republika Srbija; Republika Hrvatska	344.70	40 mg	6.57	55%	Angina pectoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109142	C01EB15	trimetazidin	MODUXIN MR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	Gedeon Richter Polska SP. Z.Z.O; Gedeon Richter PLC	Poljska; Mađarska	344.70	40 mg	6.57	55%	Angina pectoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109138	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	S.C. Labormed - Pharma S.A.	Rumunija	344.70	40 mg	6.57	55%	Angina pectoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109140	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL	kapsula sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Egis Pharmaceuticals PLC	Mađarska	590.60	40 mg	9.84	90%	Angina pectoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109125	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tableta	blister, 56 po 5 mg	Laboratorios Sevier S.L., Les laboratoires Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD.	Španija, Francuska, Irska	1.547.40	10 mg	55.26	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pectoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti - kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. - u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora. (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109126	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tableta	blister, 56 po 7,5 mg	Laboratorios Sevier S.L., Les laboratoires Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD.	Španija, Francuska, Irska	1.547.40	10 mg	36.84	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pectoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti - kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. - u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora. (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	168.30	2 g	67.32	50%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,2 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	297.00	0,3 mg	15.91	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,4 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	455.50	0,3 mg	12.20	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103090	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.2	film tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	318.20	0,3 mg	15.91	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103092	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.3	film tableta	blister, 30 po 0,3 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	312.50	0,3 mg	10.42	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103093	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.4	film tableta	blister, 30 po 0,4 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	488.10	0,3 mg	12.20	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103892	C02AC06	nifedipin	TENAXUM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	474.60	1 mg	15.82	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103038	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 2 mg	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	274.50	4 mg	18.30	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103039	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 4 mg	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	465.20	4 mg	15.51	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103046	C03BA11	indapamid	INDAPRES SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225.40	2,5 mg	12.52	75%		
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	225.40	2,5 mg	12.52	75%		
1103180	C03BA11	indapamid	VAZOPAMID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Labormed - Pharma S.A.	Rumunija	225.40	2,5 mg	12.52	75%		
1103054	C03BA11	indapamid	SOPHTENSIF	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Sopharma AD	Bugarska	225.40	2,5 mg	12.52	75%		
1400474	C03CA04	torasemid	DIUVER	tableta	blister, 30 po 5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	213.30	15mg	21.33	70%		
1400477	C03CA04	torasemid	DIUVER	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	351.10	15mg	17.56	70%		
1400480	C03DA04	eplerenon	INSPRA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Fareva Amboise	Francuska	1.199.10	50 mg	79.94	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400481	C03DA04	eplerenon	INSPRA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Fareva Amboise	Francuska	1.323.90	50 mg	44.13	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400484	C03DA04	eplerenon	DIUPOT	film tableta	blister, 30 po 25 mg	PharmaSwiss d.o.o Beograd	Republika Srbija	1.199.10	50 mg	79.94	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400485	C03DA04	eplerenon	DIUPOT	film tableta	blister, 30 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o Beograd	Republika Srbija	1.323.90	50 mg	44.13	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400482	C03DA04	eplerenon	INSTRIKA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.199.10	50 mg	79.94	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400483	C03DA04	eplerenon	INSTRIKA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.323.90	50 mg	44.13	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400488	C03DA04	eplerenon	EPLESTAR	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	1.199.10	50 mg	79.94	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400489	C03DA04	eplerenon	EPLESTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	1.323.90	50 mg	44.13	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog obojevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF <math>\leq 40\%</math>) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tableta	blister, 50 po 80 mg	Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	Nemačka	454.10	0,16 g	18.16	50%	Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1107810	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 47,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	138.10	0,15 g	13.81	40%	1. Srčana insuficijencija ( I50 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107814	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	254.20	0,15 g	12.71	40%	1. Srčana insuficijencija ( I50 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107633	C07AB12	nebivolol	BINEVOL	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	301.70	5 mg	10.06	35%		
1107634	C07AB12	nebivolol	NEVOTENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.	Republika Srbija; Bugarska, Malta	301.70	5 mg	10.06	35%		
1107666	C07AB12	nebivolol	NEBIGAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika AD, U restruktuiranju	Republika Srbija	301.70	5 mg	10.06	35%		
1107632	C07AB12	nebivolol	NEBILET	tableta	blister, 28 po 5 mg	Menarini-Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)	Nemačka; Nemačka	366.10	5 mg	13.08	50%		
1107629	C07AB12	nebivolol	BARIOS	tableta	blister, 30 po 5mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	301.70	5 mg	10.06	35%		
1107610	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	tableta	blister, 28 po 5 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	281.60	5 mg	10.06	35%		
1107301	C07AB12	nebivolol	NEBITOL	tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	281.60	5 mg	10.06	35%		
1107668	C07AB12	nebivolol	NEVOLOL	tableta	blister, 30 po 5 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	301.70	5 mg	10.06	35%		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50%	Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107659	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50%	Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107658	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	209.50	37,5 mg	10.48	50%	Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravlje d.d.	Slovenija	126.80	37,5 mg	13.59	50%	Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50%	Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	209.50	37,5 mg	10.48	50%	Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107215	C07BB12	nebivolol, hidrohlorotiazid	NEBILET PLUS 5/12,5	film tableta	blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)	Menarini - Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG	Nemačka; Nemačka	398.70	1 tableta	14.24	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1107701	C07BB12	nebivolol, hidrohlorotiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5mg+12,5mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	328.60	1 tableta	10.95	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1107702	C07BB12	nebivolol, hidrohlorotiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5mg+25mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	353.20	1 tableta	11.77	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402821	C08CA02	felodipin	PLENDIL	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 5 mg	AstraZeneca AB	Švedska	204.90	5 mg	6.83	35%	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15).	
1402843	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	152.00	10 mg	5.43	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402844	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	289.00	10 mg	5.16	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402784	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	325.80	10 mg	5.43	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402785	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 20 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	619.20	10 mg	5.16	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104650	C08GA02	amlodipin, indapamid	NATRIXAM	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 5 mg + 1.5 mg	Laboratorios Servier S.L.; Ampharm Prezdziebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratoires Servier Industrie; Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC;	Španija; Poljska; Irska; Francuska; Mađarska; Madarska	417.10	1 tableta	13.90	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1104651	C08GA02	amlodipin, indapamid	NATRIXAM	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 10 mg + 1.5 mg	Laboratorios Servier S.L.; Ampharm Prezdziebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratoires Servier Industrie; Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC;	Španija; Poljska; Irska; Francuska; Mađarska; Madarska	480.10	1 tableta	16.00	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 5 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Ampharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	415.10	4 mg	11.07	45%		
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Ampharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	415.10	4 mg	5.53	40%		
1103955	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	145.00	4 mg	4.83	35%		
1103956	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 8 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	282.20	4 mg	4.70	35%		
1103856	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	145.00	4 mg	4.83	35%		
1103857	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	282.20	4 mg	4.70	35%		
1103901	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablete	blister, 30 po 4 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	145.00	4 mg	4.83	35%		
1103906	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablete	blister, 30 po 8 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	282.20	4 mg	4.70	35%		
1103953	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tableta	blister, 60 po 4 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	290.00	4 mg	4.83	35%		
1103950	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tableta	blister, 90 po 4 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	435.00	4 mg	4.83	35%		
1103951	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tableta	blister, 60 po 8 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	564.30	4 mg	4.70	35%		
1103954	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tableta	blister, 90 po 8 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	846.50	4 mg	4.70	35%		
1103912	C09AA04	perindopril	PRENESSA	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 4 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	145.00	4 mg	4.83	35%		
1103943	C09AA04	perindopril	PRENESSA	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 8 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	278.70	4 mg	4.65	35%		
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	198.40	15 mg	14.88	55%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103732	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	234.90	15 mg	8.81	25%		
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd. Švajcarska	Republika Srbija	186.30	2,5 mg	6.21	65%		
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd. Švajcarska	Republika Srbija	461.30	2,5 mg	7.69	65%		
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	291.00	15 mg	15.59	50%		
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	347.80	15 mg	9.32	50%		
1103467	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 30 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.; Menarini - Von Heyden GmbH	Italija; Nemačka	729.30	30 mg	26.05	75%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1401060	C09BA02	enalapril, indapamid	ENZIX	tableta + film tableta	10mg+2,5mg; blister, 3x10kom	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	184.30	-	-	45%	Terapija hipertenzije kod pacijenata koji su na istovremenoj terapiji enalaprilom i indapamidom ( I10; I11).	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
1401061	C09BA02	enalapril, indapamid	ENZIX DUO	tableta + film tableta	10mg+2,5mg; blister, 3x15kom	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	258.10	-	-	35%	Terapija hipertenzije kod pacijenata koji su na istovremenoj terapiji enalaprilom i indapamidom ( I10; I11).	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
1401062	C09BA02	enalapril, indapamid	ENZIX DUO FORTE	tableta + film tableta	20mg+2,5mg; blister, 3x15kom	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	405.80	-	-	25%	Terapija hipertenzije kod pacijenata koji su na istovremenoj terapiji enalaprilom i indapamidom ( I10; I11).	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	155.30	1 tableta	5.18	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	310.40	1 tableta	10.35	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401255	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	503.10	1 tableta	16.77	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401606	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	377.80	1 tableta	12.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401607	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI HD	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10 mg+2,5mg)	Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd; Les Laboratoires Servier Industrie	Poljska; Irska; Francuska	881.00	1 tableta	29.37	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401190	C09BA04	perindopril, indapamid	PERIGARD PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	310.40	1 tableta	10.35	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401670	C09BA04	perindopril, indapamid	PERCARNIL COMBO	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (2,5 mg + 0,625 mg)	Teva Gyogyszergyar ZRT.	Mađarska	169.40	1 tableta	5.65	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401671	C09BA04	perindopril, indapamid	PERCARNIL COMBO	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Teva Gyogyszergyar ZRT.	Mađarska	290.60	1 tableta	9.69	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401672	C09BA04	perindopril, indapamid	PERCARNIL COMBO	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10 mg + 2,5 mg)	Teva Gyogyszergyar ZRT.	Mađarska	677.70	1 tableta	22.59	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401030	C09BA06	kvinapril, hidrohlorotiazid	HEMOKVIN PLUS	film tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	235.90	1 tableta	11.80	20%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401400	C09BA08	olizapril, hidrohlorotiazid	PRILAZID PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	561.70	1 tableta	18.72	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401236	C09BA09	fosinopril, hidrohlorotiazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	473.60	1 tableta	16.91	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103884	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	394.80	1 tableta	13.16	75%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103455	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM FORTE	tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	524.90	1 tableta	17.50	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103785	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	438.20	1 tableta	14.61	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103837	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Alkaoid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	303.70	1 tableta	10.12	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103887	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	Alkaoid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	337.10	1 tableta	11.24	30%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103888	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Alkaoid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	403.80	1 tableta	13.46	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103112	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Iraska; Francuska	409.60	1 tableta	13.65	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103114	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Iraska; Francuska	608.50	1 tableta	20.28	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103115	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner za tablete, 30 po (10 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Iraska; Francuska	744.00	1 tableta	24.80	75%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103116	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner za tablete, 30 po (10 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Iraska; Francuska	699.00	1 tableta	23.30	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103851	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 5 mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	282.40	1 tableta	9.41	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103852	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 10 mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	282.40	1 tableta	9.41	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103853	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 5 mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	465.30	1 tableta	15.51	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103854	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 10 mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	493.40	1 tableta	16.45	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103870	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSINI	tableta	blister, 30 po (2,85 mg + 2,5 mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	348.50	1 tableta	11.62	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103871	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSINI	tableta	blister, 30 po (5,7 mg + 5 mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	533.80	1 tableta	17.79	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103957	C09BB04	perindopril, amlodipin	PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA	tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 5 mg)	Teva Gyogyszergyar ZRT.	Mađarska	315.10	1 tableta	10.50	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103958	C09BB04	perindopril, amlodipin	PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA	tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 10 mg)	Teva Gyogyszergyar ZRT.	Mađarska	468.10	1 tableta	15.60	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103959	C09BB04	perindopril, amlodipin	PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA	tableta	kontejner za tablete, 30 po (10 mg + 5 mg)	Teva Gyogyszergyar ZRT.	Mađarska	572.30	1 tableta	19.08	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103975	C09BB04	perindopril, amlodipin	PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA	tableta	kontejner za tablete, 30 po (10 mg + 10 mg)	Teva Gyogyszergyar ZRT.	Mađarska	537.70	1 tableta	17.92	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103996	C09BB04	perindopril, amlodipin	VAZOTAL DUO	tableta	blister, 30 po (4 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	282.40	1 tableta	9.41	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103997	C09BB04	perindopril, amlodipin	VAZOTAL DUO	tableta	blister, 30 po (4 mg + 10 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	282.40	1 tableta	9.41	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103998	C09BB04	perindopril, amlodipin	VAZOTAL DUO	tableta	blister, 30 po (8 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	465.30	1 tableta	15.51	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103999	C09BB04	perindopril, amlodipin	VAZOTAL DUO	tableta	blister, 30 po (8 mg + 10 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	493.40	1 tableta	16.45	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403021	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN MITE	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	428.40	1 tableta	15.30	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403020	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (5 mg + 5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	473.40	1 tableta	16.91	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103314	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLORAM	kapsula, tvrda	blister, 30 po (2,5 mg + 5 mg)	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	268.60	1 tableta	8.95	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103316	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLORAM	kapsula, tvrda	blister, 30 po (5 mg + 5 mg)	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	358.00	1 tableta	11.93	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103317	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLORAM	kapsula, tvrda	blister, 30 po (5 mg + 10 mg)	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	397.80	1 tableta	13.26	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103315	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLORAM	kapsula, tvrda	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	402.80	1 tableta	13.43	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103310	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	kapsula, tvrda	blister, 28 po (5mg + 5mg)	Lek Farmaceutvska Družba D.D.	Slovenija	334.10	1 tableta	11.93	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103311	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	kapsula, tvrda	blister, 28 po (5mg + 10mg)	Lek Farmaceutvska Družba D.D.	Slovenija	371.30	1 tableta	13.26	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103312	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	kapsula, tvrda	blister, 28 po (10mg + 5mg)	Lek Farmaceutvska Družba D.D.	Slovenija	375.90	1 tableta	13.43	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103313	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	kapsula, tvrda	blister, 28 po (10mg + 10mg)	Lek Farmaceutvska Družba D.D.	Slovenija	492.10	1 tableta	17.58	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103302	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	kapsula, tvrda	blister, 30 po (2,5 mg + 5 mg)	Belupo D.D.	Republika Hrvatska	268.60	1 tableta	8.95	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103303	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	kapsula, tvrda	blister, 30 po (5 mg + 5 mg)	Belupo D.D.	Republika Hrvatska	358.00	1 tableta	11.93	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103304	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	kapsula, tvrda	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Belupo D.D.	Republika Hrvatska	402.80	1 tableta	13.43	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103605	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 5 mg + 0.625 mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spółka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	271.60	1 tableta	9.05	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103608	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+5mg+1.25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spółka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	385.80	1 tableta	12.86	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103611	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+10mg+1.25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spółka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	411.40	1 tableta	13.71	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103614	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+5mg+2.5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spółka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	648.00	1 tableta	21.60	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103617	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+10mg+2.5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spółka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	710.50	1 tableta	23.68	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103600	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1.25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przemysłowe Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Madarska; Poljska; Irska; Francuska	755.40	1 tableta	25.18	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103602	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1.25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przemysłowe Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Madarska; Poljska; Irska; Francuska	781.10	1 tableta	26.04	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103603	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2.5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przemysłowe Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Madarska; Poljska; Irska; Francuska	875.30	1 tableta	29.18	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103604	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2.5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przemysłowe Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Madarska; Poljska; Irska; Francuska	929.60	1 tableta	30.99	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103351	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Hemfarm a.d.	Republika Srbija	173.50	50 mg	5.78	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103350	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	374.20	50 mg	6.24	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103594	C09CA01	losartan	LOSAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	173.50	50 mg	5.78	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103000	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	173.50	50 mg	5.78	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103001	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	374.20	50 mg	6.24	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103792	C09CA01	losartan	LORISTA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	161.90	50 mg	5.78	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103003	C09CA01	losartan	AVELOSARTAN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	173.50	50 mg	5.78	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	165.70	80 mg	5.92	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	256.30	80 mg	4.58	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103449	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 320 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	541.90	80 mg	4.84	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103782	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	256.30	80 mg	4.58	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103784	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	165.70	80 mg	5.92	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103717	C09CA03	valsartan	BRAZART	film tableta	blister, 30 po 80 mg	EMS, S.A.	Brazil	177.50	80 mg	5.92	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103718	C09CA03	valsartan	BRAZART	film tableta	blister, 30 po 160 mg	EMS, S.A.	Brazil	274.50	80 mg	4.58	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103719	C09CA03	valsartan	BRAZART	film tableta	blister, 30 po 320 mg	EMS, S.A.	Brazil	580.50	80 mg	4.84	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103960	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	177.50	80 mg	5.92	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103965	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 30 po 160 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	274.50	80 mg	4.58	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103401	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	398.70	0,15 g	13.29	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103403	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	503.00	0,15 g	8.38	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blister, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	307.30	40 mg	10.98	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	493.70	40 mg	8.82	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103509	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 40mg	Actavis LTD	Malta	253.30	40 mg	8.44	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103510	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 80mg	Actavis LTD	Malta	423.30	40 mg	7.06	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103930	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka D.D. Novo Mesto Krka Polska SP. Z.O.O.	Slovenija; Poljska	236.40	40 mg	8.44	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103931	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka D.D. Novo Mesto Krka Polska SP. Z.O.O.	Slovenija; Poljska	395.10	40 mg	7.06	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103932	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 40mg	Actavis LTD	Malta	236.40	40mg	8.44	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103933	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 80mg	Actavis LTD	Malta	395.10	40mg	7.06	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401914	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LOSAR PLUS	film tableta	blister, 30 po (50 mg + 12.5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	245.60	1 tableta	8.19	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401120	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LORISTA H	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12.5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	229.30	1 tableta	8.19	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401121	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LORISTA HD	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	377.40	1 tableta	13.48	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103152	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	ERYNORM PLUS	film tableta	blister, 30 po (50mg+12.5mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	245.60	1 tableta	8.19	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401926	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 12.5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	273.50	1 tableta	9.77	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401925	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	290.40	1 tableta	10.37	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401924	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (80mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	229.10	1 tableta	8.18	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401935	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg+25mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	290.40	1 tableta	10.37	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401934	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	273.50	1 tableta	9.77	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401933	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (80mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	229.10	1 tableta	8.18	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401006	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	BRAZART PLUS	film tableta	blister, 30 po (80 mg + 12.5 mg)	EMS, S.A.	Brazil	245.50	1 tableta	8.18	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401009	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	BRAZART PLUS	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 12.5 mg)	EMS, S.A.	Brazil	293.00	1 tableta	9.77	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401008	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	BRAZART PLUS	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 25 mg)	EMS, S.A.	Brazil	311.20	1 tableta	10.37	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103970	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (80mg+12.5mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	245.50	1 tableta	8.18	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103971	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (160mg+12.5mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	293.00	1 tableta	9.77	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103972	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (160mg+25mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	311.20	1 tableta	10.37	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401662	C09DA04	irbesartan, hidrohlorotiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (150 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	381.00	1 tableta	12.70	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401663	C09DA04	irbesartan, hidrohlorotiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (300 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	469.20	1 tableta	15.64	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401053	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	MICARDIS PLUS	tableta	28 po (80 mg + 12,5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	527.40	1 tableta	18.84	75%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401003	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (40mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	308.50	1 tableta	11.02	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401004	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	454.40	1 tableta	16.23	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401005	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+25mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	477.80	1 tableta	17.06	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103672	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (40mg+12.5mg)	Actavis LTD	Malta	330.60	1 tableta	11.02	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103671	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+12.5mg)	Actavis LTD	Malta	486.90	1 tableta	16.23	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103670	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+25mg)	Actavis LTD	Malta	511.80	1 tableta	17.06	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401064	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 80mg+12.5mg	Actavis LTD	Malta	454.40	1 tableta	16.23	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103804	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tableta	blister, 28 po (80mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d., TAD Pharma GmbH, Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	226.60	1 tableta	8.09	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103805	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tableta	28 po (160mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d., TAD Pharma GmbH, Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	318.10	1 tableta	11.36	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103806	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tableta	28 po (160mg+10mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d., TAD Pharma GmbH, Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	344.80	1 tableta	12.31	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	229.40	30 mg	11.47	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.40	30 mg	13.14	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	122.60	30 mg	13.14	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	214.10	30 mg	11.47	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	351.20	30 mg	9.41	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	131.40	30 mg	13.14	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	229.40	30 mg	11.47	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	376.30	30 mg	9.41	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	283.20	30 mg	14.16	75%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	398.60	30 mg	9.97	75%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	404.50	20 mg	6.74	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	233.30	20 mg	15.55	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	351.60	20 mg	11.72	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	404.50	20 mg	6.74	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	233.30	20mg	15.55	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	351.60	20mg	11.72	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	404.50	20mg	6.74	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	404.50	20 mg	6.74	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	175.80	10 mg	12.56	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	399.10	10 mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	506.70	10 mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	463.20	10 mg	4.14	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	427.60	10 mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	543.00	10 mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	175.80	10 mg	12.56	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	188.40	10 mg	12.56	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	427.60	10 mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	543.00	10 mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	427.60	10 mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	543.00	10 mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	496.20	10 mg	4.14	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	427.60	10 mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	543.00	10 mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	427.60	10 mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	543.00	10 mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104555	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	EMS, S.A.	Brazil	188.40	10 mg	12.56	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104571	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	427.60	10mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104572	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	543.00	10mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104736	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 10mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	399.10	10 mg	14.25	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104737	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 20mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	506.70	10 mg	9.05	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104594	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma B.V.; HBM Pharma S.R.O.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Hrvatska; Holandija; Slovačka; Velika Britanija; Španija	188.40	10 mg	12.56	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104770	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	188.40	10 mg	12.56	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula, tvrda	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	439.80	0.2 g	18.33	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/L.
1104233	C10AB05	fenofibrat	ZYGLIP	tableta	blister, 30 po 145 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	417.70	0.2g	19.20	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/L.
1104235	C10AB05	fenofibrat	LIPANTHYL 145	film tableta	blister, 30 po 145 mg	Recipharm Fontaine; Mylan Laboratories SAS	Francuska; Francuska	495.30	0.2 g	22.77	60%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/L.
1104236	C10AB05	fenofibrat	FIBRETA	film tableta	blister, 30 po 160 mg	Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Poljska; Hrvatska	439.80	0.2 g	18.33	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/L.
1104010	C10BA04	simvastatin, fenofibrat	TREAKOL	film tableta	blister, 30 po (20mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	898.90	1 tableta	29.96	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104011	C10BA04	simvastatin, fenofibrat	TREAKOL	film tableta	blister, 30 po (40mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	1,119.60	1 tableta	37.32	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104640	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+2.5mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	814.50	1 kapsula	29.09	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104641	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+5mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	901.30	1 kapsula	32.19	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104642	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+10 mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	1,084.80	1 kapsula	38.74	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
4139160	D06BB03	ackiklovir	ACIKLOVIR ACTAVIS	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravlje a.d.; Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija; Republika Srbija	400.10	-	-	70%		
4090291	D06BB03	ackiklovir	HERPLEX	krem	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	254.10	-	-	50%		
4139162	D06BB03	ackiklovir	ACIKLOVIR UNION	krem	tuba, 1 po 10g (50mg/g)	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	508.20	-	-	50%		
4152104	D07AB10	alkilometazon	AFLODERM	krem	tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)	Belupo d.d.	Hrvatska	284.10	-	-	75%		
4152100	D07AB10	alkilometazon	AFLODERM	mast	tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)	Belupo d.d.	Hrvatska	284.10	-	-	75%		
4153440	D07AC13	mometazon	ELOCOM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	243.00	-	-	80%		
4153441	D07AC13	mometazon	ELOCOM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	243.00	-	-	80%		
1155442	D10BA01	izotretinoin	ROACCUTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	769.80	30 mg	76.98	25%	Akne conglobata ( L70.1).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1155450	D10BA01	izotretinoin	AKNOVA	kapsula, meka	blister, 30 po 10 mg	Garmed Farmaceutica, LTDA	Brazil	769.80	30 mg	76.98	25%	Akne conglobata ( L70.1).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
6137312	G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin b	POLYGYNAX	vaginalna kapsula, meka	blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)	Innothera Chouzy	Francuska	711.20	-	-	70%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
4157290	G01AF15	butokonazol	GYNOFORT	vaginalni krem	aplikator, 1 po 5 g (20 mg/g)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	686.20	0,1 g	686.20	90%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1149080	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	243.50	75 mcg	81.17	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1149081	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 30 po 75 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	2.085.00	75 mcg	69.50	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1135288	G03AA15	hormadinon, etinilestradiol	BELARA	film tableta	blister, 21 po (2mg + 0.03mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	926.60	0,75 tableta	33.09	90%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048293	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	481.90	10 mg	24.10	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048790	G03FA17	drosipirenon, estradiol	ANGELIQ	film tableta	blister, 28 po (2 mg +1 mg)	Bayer AG; Bayer Farmaceutvska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	907.30	1 tableta	32.40	85%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiolvalerat	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	190.20	0,75 tabl.	6.79	25%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Francuska; Nemačka	2.210.60	0,1 g	88.42	25%	Maligni tumor prostate (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1048176	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol	DIANE-35	obložena tableta	blister, 1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)	Bayer Pharma AG; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	419.10	0,75 tabl.	14.97	15%	1. Idiopatski hirzulizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju. 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1139173	G04BD07	tolterodin	DETRUSITOL	film tableta	blister, 28 po 2 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1.046.50	4 mg	74.75	70%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139022	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	415.80	5 mg	41.58	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139020	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1.247.40	5 mg	41.58	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139021	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1.487.40	5 mg	24.79	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139025	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.247.40	5 mg	41.58	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139026	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.487.40	5 mg	24.79	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139668	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	415.80	5 mg	41.58	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139667	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	1.247.40	5 mg	41.58	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139666	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pharmaswiss d.o.o.	Republika Srbija	1.487.40	5 mg	24.79	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139010	G04BD09	tropisijum hlorid	INKONTAN	film tableta	blister, 20 po 15 mg	Farmazeutische Fabrik Montavil Ges.m.b.H	Austrija	491.40	40 mg	65.52	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139012	G04BD09	tropisijum hlorid	INKONTAN	film tableta	blister, 20 po 30 mg	Farmazeutische Fabrik Montavil Ges.m.b.H	Austrija	907.90	40 mg	60.53	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139051	G04BD12	mirabegron	BETMIGA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 50 mg	Astellas Pharma Europe B.V	Holandija	3.359.20	50mg	111.97	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	359.00	0,4 mg	11.97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	359.00	0,4 mg	11.97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134355	G04CA02	tamsulosin	TANYZ	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4mg	Krika, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	359.00	0,4 mg	11.97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134242	G04CA02	tamsulosin	TAMLOS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	359.00	0,4 mg	11.97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134667	G04CA02	tamsulosin	TAMPROST	tableta sa produženim oslobađanjem	30 po 0,4mg	Salutas Pharma GmbH; Lek Pharmaceuticals D.D; Lek, S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmaceutska družba D.D	Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija	359.00	0,4 mg	11.97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134666	G04CA02	tamsulosin	TAMSUDIL T	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,4 mg	Teva Gyogyszergyar Zrt	Mađarska	359.00	0,4 mg	11.97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1194244	G04CA02	tamsulosin	TAMSULOSIN PHS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaS d.o.o. Beograd; Syntho Hispania SL	Republika Srbija; Španija	359.00	0,4 mg	11.97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1134237	G04CA02	tamsulosin	FLOSIN	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Menarini-Von Hezden GmbH; Synthon Hispania, S.L.	Nemačka; Španija	359,00	0,4 mg	11,97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134134	G04CA02	tamsulosin	TANYZ ERAS	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,4 mg	Krka D.D., Novo Mesto; Synthon Hispania, S.L.; Synthon BV; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Španija; Holandija; Nemačka	359,00	0,4 mg	11,97	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134250	G04CA52	tamsulosin, dutasterid	DUTAPROST COMB	kapsula, tvrda	boca plastična, 30 po (0,4 mg + 0,5 mg)	Laboratorios Leon Farma, S.A.	Španija	753,50	1 kapsula	25,12	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134251	G04CA52	tamsulosin, dutasterid	DUOTAM	kapsula, tvrda	boca plastična, 30 po (0,4 mg + 0,5 mg)	Alkaid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	753,50	1 kapsula	25,12	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134249	G04CA52	tamsulosin, dutasterid	DUTAMERA	kapsula, tvrda	boca plastična, 30 po (0,4 mg + 0,5 mg)	Laboratorios Leon Farma, S.A.	Španija	753,50	1 kapsula	25,12	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134243	G04CA53	tamsulosin, sulfenacin	VESOMNI	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po (0,4 mg + 6 mg)	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	2.807,60	1 tableta	93,59	85%	1. Inhibitor beta (N39.4) 2. Urinarna inkontinencija (N39.3) 3. Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	379,80	5 mg	13,56	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134228	G04CB01	finasterid	BENEPROST	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	313,60	5 mg	10,45	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134212	G04CB01	finasterid	FINASTERID PHARMAS	film tableta	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	292,70	5 mg	10,45	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134266	G04CB01	finasterid	MOLUSKAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska	292,70	5mg	10,45	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134351	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tableta	blister, 30 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	313,60	5 mg	10,45	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134350	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tableta	blister, 28 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	292,70	5 mg	10,45	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134356	G04CB01	finasterid	PROSTEF	film tableta	blister, 30 po 5 mg	EMS, S.A.	Brazil	313,60	5 mg	10,45	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1113413	G04CB02	dutasterid	DATUST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	561,40	0,5 mg	18,71	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134261	G04CB02	dutasterid	DUTRYS	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon Farma, S.A.; Krka d.d., Novo Mesto	Španija; Slovenija	561,40	0,5 mg	18,71	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134305	G04CB02	dutasterid	AVODART	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	729,70	0,5 mg	24,32	85%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134400	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Alkaid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	561,40	0,5 mg	18,71	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134290	G04CB02	dutasterid	DUTASTERID SANDOZ	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Lek Farmaceutvska družba d.d.	Slovenija	561,40	0,5 mg	18,71	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134510	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon Farma, S.A.	Španija	561,40	0,5 mg	18,71	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134304	G04CB02	dutasterid	VERION	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	561,40	0,5 mg	18,71	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1.891,90	240 mcg	252,25	10%		
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3.725,00	240 mcg	248,33	10%		
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 2,4 ml (20 mcg/80 mci)	Lilly France	Francuska	27.397,00	20 mcg	978,46	55%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0040244	H05AA02	teriparatid	TERROSA	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 2,4 ml (20mcg/80ul)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	14.878,30	20 mcg	531,37	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0040243	H05AA02	teriparatid	MOVYMIA	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 2,4 ml (20mcg/80ul)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	14.878,30	20 mcg	531,37	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0040242	H05AA02	teriparatid	MOVYMA	rastvor za injekciju	uložak, 3 po 2,4 ml (20mcg/80µl)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	44.634.70	20 mcg	531.37	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1021600	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	323.40	1 g	86.24	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021601	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	762.00	1 g	76.20	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021607	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	383.00	1 g	31.27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021566	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	346.40	1 g	69.28	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021567	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	245.90	1 g	28.10	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021560	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	519.50	1 g	69.27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021632	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	Glaxo Wellcome Production; Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.	Francuska; Poljska	434.50	1 g	35.47	60%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021561	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blister, 14 po (500mg+125mg)	Belupo, Ijekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	484.90	1g	69.27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021562	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blister, 14 po (875mg+125mg)	Belupo, Ijekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	344.20	1g	28.10	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021611	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	519.50	1g	69.27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021610	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	273.60	1g	31.27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1321900	J01DB05	cefadrokisil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skoplje	Republika Severna Makedonija	385.90	2g	96.48	40%	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta ( J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0); 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	323.80	0.5 g	64.76	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	410.50	0,5 g	41.05	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	638.50	0,5 g	45,61	55%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta ( J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turska	410.50	0,5 g	41,05	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta ( J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321610	J01DC04	cefahlor	CEFAKLOR ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	696.70	1 g	87,09	80%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GMBH	Nemačka	646.50	1 g	129.30	85%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	
1321620	J01DD08	cefiksims	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	512.80	0,4 g	51,28	70%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321622	J01DD08	cefiksims	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	256.40	0,4 g	51,28	70%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321623	J01DD08	cefiksims	CEFAPAN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	461.50	0,4 g	46,15	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321521	J01DD13	cefipodoksims	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	313.70	0,4 g	125.48	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321523	J01DD13	cefipodoksims	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	627.60	0,4 g	125.52	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	409.80	0,3 g	81,96	50%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	353.80	0,5 g	25,27	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41- J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	196.40	0,5 g	28,06	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41- J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	392.90	0,5 g	28,06	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41- J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	353.80	0,5 g	25,27	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41- J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	196.40	0,5 g	28.06	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ). 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ). 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	201.40	0,3 g	40.28	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56). 5. Nagonokokni uretritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72).	
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186.60	0,3 g	37.32	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56). 5. Nagonokokni uretritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72).	
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	201.40	0,3 g	40.28	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Infekcija srednjeg uha (H65; H66). 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56). 5. Nagonokokni uretritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72).	
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	169.60	0,3 g	33.92	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56). 5. Nagonokokni uretritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72).	
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	169.60	0,3 g	33.92	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56). 5. Nagonokokni uretritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72).	
1325563	J01FA10	azitromicin	AZINOCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	EMS, S.A.; Galenika a.d.	Brazil; Republika Srbija	169.60	0,3 g	33.92	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56). 5. Nagonokokni uretritis (N34.1). 6. Cervicitis (N72).	
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	255.90	1,2 g	85.30	25%		
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	479.40	1,2 g	79.90	25%		
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,198.50	1,2 g	79.90	25%		
1329380	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	407.90	0,5 g	81.58	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329381	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	680.10	0,5 g	68.01	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329456	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	748.10	0,5 g	74.81	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329104	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Actavis LTD	Malta	407.90	0,5 g	81.58	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329105	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Actavis LTD	Malta	680.10	0,5 g	68.01	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329506	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	285.50	0,5 g	81.57	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329505	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	476.10	0,5 g	68.01	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329081	J01MA12	levofloksacin	FOVELID	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alkaloid a.d.; Pharmathen S.A.	Republika Severna Makedonija; Grčka	407.90	0,5 g	81.58	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329080	J01MA12	levofloksacin	FOVELID	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alkaloid a.d.; Pharmathen S.A.	Republika Severna Makedonija; Grčka	680.10	0,5 g	68.01	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329095	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 250mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d.Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	407.90	500 mg	81.58	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329098	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 500mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d.Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	680.10	500 mg	68.01	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329810	J01MA12	levofloksacin	LEBEL	film tableta	blister, 7 po 500mg	Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.	Turska	476.10	0,5 g	68.01	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329507	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	680.10	0,5 g	68.01	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329001	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	671.70	0,4 g	67.17	30%	1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J16), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329006	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tableta	blister, 7 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o.; DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	470.20	0.4 g	67.17	30%	1. Akutni bakterijski sinusitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1329007	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o.; DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	671.70	0.4 g	67.17	30%	1. Akutni bakterijski sinusitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1132320	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEM	kapsula	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	298.40	0.8 g	59.68	25%		
3029730	J01XX01	fosfomicin	MONURAL	granule za oralni rastvor	kesica, 1 po 8g (3g fosfomicina)	Zambon Switzerland Ltd	Švajcarska	298.40	3 g	298.40	25%	Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih patogenima osetljivim na fosfomicin kod osoba starijih od 12 godina (N30.0).	
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151.10	0.2 g	201.47	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151.10	0.2 g	86.34	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1327401	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	151.10	0.2 g	86.34	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1327400	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	151.10	0.2 g	201.47	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1327402	J02AC02	itakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 10 po 100 mg	Staviamed d.o.o.	Republika Srbija	697.50	0.2 g	139.50	30%	1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ), 2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ), 4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1039010	L02BA01	tamoksifen	NOLVADEX	film tableta	blister, 30 po 10 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	344.20	20 mg	22.95	40%		
1037200	L02BB01	flutamid	FLUTASIN	tableta	boca staklena, 90 po 250 mg	S.C. Sincan-Pharma S.R.L.	Rumunija	3.577.10	0,75 g	119.24	20%	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1039325	L02BG03	anastrozol	ARIMIDEX	film tableta	blister, 28 po 1 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1.069.80	1 mg	38.21	25%	Karcinom dojke: 1. Ranim steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinom dojke kod postmenopauzih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinom dojke u postmenopauzih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014301	L04AA13	leflunomid	ARAVA	film tableta	bočica, 30 po 20 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	3.592.20	20 mg	119.74	10%	1. Aktivni reumatoidni artritis ( M05 i M06 ) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja ( gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo ) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije; 2. Aktivni psorijazni artritis ( M07 ) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja ( gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo ) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1059079	M05BA04	alendronska kiselina	BONAP	tableta	blister, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	613.70	10 mg	21.92	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1059908	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	613.70	10 mg	21.92	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1059909	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.227.30	10 mg	21.92	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1059907	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.841.00	10 mg	21.92	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	479.60	5 mg	15.99	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	film tableta	blister, 1 po 150 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	479.60	5 mg	15.99	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1059000	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Stada Arzneimittel AG; Stadapharm GmbH; Synthron Hispania, S.L.	Nemačka; Nemačka; Španija	479.60	5 mg	15.99	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1059121	M05B03	alendronska kiselina, holekalciferol	FOSAVANCE	tableta	blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	554.20	10 mg	19.79	55%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck.
1087660	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (5mg + 2.5mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka; Velika Britanija	576.50	75 mg	288.25	60%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligmnim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087662	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (10mg + 5mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka; Velika Britanija	1.071.20	75 mg	267.80	60%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligmnim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087664	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka; Velika Britanija	1.944.80	75 mg	243.10	60%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligmnim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087666	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (40mg + 20mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka; Velika Britanija	3.482.50	75 mg	217.66	60%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligmnim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
9087565	N02AB03	fentani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4.2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	723.60	1,2 mg	41.35	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), - trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kazualgija ( R52.1 ), - spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricični antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospijahijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.447.10	1,2 mg	41.35	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kaulalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospihijatra.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.455.20	1,2 mg	46.77	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kaulalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospihijatra.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.425.00	1,2 mg	34.64	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kaulalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospihijatra.
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	723.60	1,2 mg	42.10	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kaulalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospihijatra.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	1.447.10	1,2 mg	42.10	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kaulalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospihijatra.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.455.20	1,2 mg	47.62	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kaulalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.425.00	1,2 mg	35,27	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ), - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kaulzalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopolimiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neurospihijatra.
9182000	N02AE01	buprenorfin	TRANSTEC	transdermalni flaster	kesica, 4 po 35 mcg/h (20 mg/1 flaster)	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.080.60	1,2 mg	16,21	85%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
9182002	N02AE01	buprenorfin	TRANSTEC	transdermalni flaster	kesica, 4 po 52,5 mcg/h (30mg/1 flaster)	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.620.80	1,2 mg	12,16	85%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
9182001	N02AE01	buprenorfin	TRANSTEC	transdermalni flaster	kesica, 4 po 70 mcg/h (40 mg/1 flaster)	Grunenthal GmbH	Nemačka	2.444.30	1,2 mg	18,33	85%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087456	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 50 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.831.70	0,4 g	488,45	75%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087457	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 100 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	3.612.10	0,4 g	481,61	75%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087458	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 150 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	4.660.80	0,4 g	414,29	75%	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa nemaligim oboljenjem (R52.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087453	N02AX06	tapentadol	PALEXIA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.887.70	0,4 g	503,39	75%	Terapija umerenog do jakog akutnog bola kod odraslih, kada se on može adekvatno kupirati samo opioidnim analgeticima (R52).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN SLAVIAMED	tableta	blister, 2 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	223.30	50 mg	111,65	50%	Migrena ( G43 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurospihijatra.
1086724	N02CC03	zolmitriptan	TRECAR	oralna disperzibilna tableta	blister, 3 po 2,5mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	355.70	2,5 mg	118,57	55%	Migrena (G43).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurospihijatra.
1086730	N02CC07	frovatriptan	FROVAMAX	film tableta	blister, 2 po 2,5 mg	A. Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.R.L.; Laboratorios Menarini S.A.	Italija; Španija	391.60	2,5 mg	195,80	85%	Migrena (G43)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurospihijatra
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	764.40	1,8 g	91,73	85%	Neuropatski bol ( G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurospihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	764.40	1,8 g	91,73	85%	Neuropatski bol ( G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neurospihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084821	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	UCB Pharma SA	Belgija	879.90	1,5 g	87.99	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra/neurohirurga/ psihijatra/ dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084820	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	UCB Pharma SA	Belgija	1.610.40	1,5 g	80.52	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra/neurohirurga/ psihijatra/ dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084822	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	UCB Pharma SA	Belgija	2.626.80	1,5 g	65.67	25%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra/neurohirurga/ psihijatra/ dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	337.50	0,3 g	72.32	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	672.50	0,3 g	48.04	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1.153.50	0,3 g	41.20	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.209.60	0,3 g	39.46	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	720.50	0,3 g	48.03	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.235.90	0,3 g	41.20	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.767.00	0,3 g	117.80	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.099.50	0,3 g	117.80	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084108	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 75mg	Krka, tovarna zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	672.50	0,3 g	48.04	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka, tovarna zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.153.50	0,3 g	41.20	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuro psihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 na osnovu mišljenja onkologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 300mg	Krka, tovarna zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2.209.60	0,3 g	39.46	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084144	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan B.V.; Modernmott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.; Logisters, Logistica Portugal, S.A.	Holandija; Irska; Mađarska; Portugal	672.50	0,3 g	48.04	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084145	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan B.V.; Modernmott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.; Logisters, Logistica Portugal, S.A.	Holandija; Irska; Mađarska; Portugal	1.153.50	0,3 g	41.20	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084850	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.099.50	0,3 g	117.80	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084851	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	672.50	0,3 g	48.04	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084852	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.153.50	0,3 g	41.20	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084853	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.209.60	0,3 g	39.46	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084919	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1.099.50	0,3 g	117.80	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084920	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	672.50	0,3 g	48.04	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084921	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1.153.50	0,3 g	41.20	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084922	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka	1.767.00	0,3 g	117.80	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084923	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka	672.50	0,3 g	48.04	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084924	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka	1.153.50	0,3 g	41.20	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1085271	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	boca plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	4.652.30	0,45 g	209.35	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085272	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	boca plastična, 100 po (150 mg + 37.5 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	4.652.30	0,45 g	139.57	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085000	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (100mg + 25mg + 200mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	3.804.90	0,45 g	171.22	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085009	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (150mg + 37,5mg + 200mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	3.830.80	0,45 g	114.92	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085002	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (200mg + 50mg + 200mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	3.856.70	0,45 g	86.78	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085344	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	542.80	6 mg	58.16	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085348	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1.056.60	6 mg	56.60	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085349	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1.839.00	6 mg	49.26	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085363	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	471.80	6 mg	50.55	20%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085364	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	918.70	6 mg	49.22	20%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085365	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	1.599.20	6 mg	42.84	20%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085290	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	387.10	2,5 mg	129.03	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085291	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.529.70	2,5 mg	127.48	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085081	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 0,26 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	174.00	2,5 mg	116.00	40%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085082	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,52 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	990.10	2,5 mg	110.01	35%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085084	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,05 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.914.30	2,5 mg	106.35	35%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085083	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,1 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.454.60	2,5 mg	95.96	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085066	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,26 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	480.00	2,5 mg	106.67	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085064	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,52 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	959.90	2,5 mg	106.66	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085062	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,05 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	1.875.90	2,5 mg	104.22	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085060	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,57 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	3.485.40	2,5 mg	129.09	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085058	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,1 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	3.454.60	2,5 mg	95.96	30%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085080	N04BD02	rasagilin	AZILECT	tableta	blister, 28 po 1 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP. Z.O.O.	Holandija; Hrvatska; Poljska	2.232.10	1 mg	79.72	85%	Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti ( G20 ), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1085085	N04BD02	rasagilin	RAZIX	tableta	blister, 28 po 1 mg	Synthon Hispania, SL; Synthon S.R.O.; Synthon BV	Španija; Češka; Holandija	1.717.00	1 mg	61.32	75%	Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1085284	N04BX02	entakapon	COMTAN	film tableta	bočica plastična, 30 po 200 mg	Orion Corporation Orion Pharma, Novartis Pharma GmbH;	Finska; Nemačka	2.334.40	1 g	389.07	60%	Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1070961	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 40 mg	R-Pharm Germany GmbH; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH BETRIEBSSTATTE FREIBURG	Nemačka; Nemačka	2.605.70	80 mg	173.71	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070850	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 60 mg	R-Pharm Germany GmbH; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH BETRIEBSSTATTE FREIBURG	Nemačka; Nemačka	2.605.70	80 mg	115.81	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070851	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 80 mg	R-Pharm Germany GmbH; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH BETRIEBSSTATTE FREIBURG	Nemačka; Nemačka	2.605.70	80 mg	86.86	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070965	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blister, 50 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	971.70	0,3 g	58.30	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070963	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blister, 50 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	281.60	0,3 g	67.58	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070022	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	50 po 100 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	971.70	0,3 g	58.30	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070020	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	blister, 50 po 25 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	281.60	0,3 g	67.58	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070606	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Mylan Hungary Kft.; McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin	Mađarska; Irska	1.079.70	0,3 g	64.78	30%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Mylan Hungary Kft.; McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin	Mađarska; Irska	312.90	0,3 g	75.10	35%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070210	N05AH02	klozapin	NEOZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 50 po 25 mg	Synthon Hispania, SL.; Synthon BV	Španija; Holandija	281.60	0,3 g	67.58	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070211	N05AH02	klozapin	NEOZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 50 po 100 mg	Synthon Hispania, SL.; Synthon BV	Španija; Holandija	971.70	0,3 g	58.30	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070212	N05AH02	klozapin	NEOZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 50 po 200 mg	Synthon Hispania, SL.; Synthon BV	Španija; Holandija	1.943.40	0,3 g	58.30	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070945	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	517.50	0,4 g	138.00	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070946	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.520.40	0,4 g	101.36	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070948	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2.011.80	0,4 g	67.06	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070906	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Actavis LTD	Malta	593.80	0,4 g	158.35	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070907	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Actavis LTD	Malta	1.547.70	0,4 g	103.18	60%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070909	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Actavis LTD	Malta	2.011.80	0,4 g	67.06	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070955	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Belupo, lekovi i kozmetika dd	Hrvatska	1.520.40	0,4 g	101.36	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070956	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Belupo, lekovi i kozmetika dd	Hrvatska	2.011.80	0,4 g	67.06	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070331	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	746.10	0,4 g	99.48	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070332	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 150 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.320.50	0,4 g	58.69	40%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070330	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 200 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.582.70	0,4 g	52.76	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070333	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 300 mg	Krka D.D., Novo mesto; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	2.026.50	0,4 g	45.03	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070701	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	Merckle GmbH	Nemačka	746.10	0,4 g	99.48	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070702	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 150 mg	Merckle GmbH	Nemačka	1.320.50	0,4 g	58.69	40%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070703	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 200 mg	Merckle GmbH	Nemačka	1.582.70	0,4 g	52.76	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070704	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 300 mg	Merckle GmbH	Nemačka	2.026.50	0,4 g	45.03	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070705	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 400 mg	Merckle GmbH	Nemačka	2.702.00	0,4 g	45.03	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070892	N05AH04	kvetiapin	PENTIAX	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pojska	517.50	0,4 g	138.00	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070891	N05AH04	kvetiapin	PENTIAX	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pojska	1.520.40	0,4 g	101.36	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070890	N05AH04	kvetiapin	PENTIAX	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pojska	2.011.80	0,4 g	67.06	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.454.50	5 mg	72.73	25%	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070129	N05AX15	kariprazin	REAGILA	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Gedeon Richter PLC	Mađarska	4.689.00	3mg	334.93	30%	Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070127	N05AX15	kariprazin	REAGILA	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Gedeon Richter PLC	Mađarska	4.689.00	3mg	167.46	30%	Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070126	N05AX15	kariprazin	REAGILA	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Gedeon Richter PLC	Mađarska	4.689.00	3mg	111.64	30%	Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070125	N05AX15	kariprazin	REAGILA	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Gedeon Richter PLC	Mađarska	4.689.00	3mg	83.73	30%	Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1071710	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM HF	tableta	30 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	135.50	2,5 mg	11.29	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071711	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM HF	tableta	20 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	161.30	2,5 mg	8.07	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071715	N05BA06	lorazepam	LORSILAN	tableta	blister, 30 po 1 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	135.50	2,5 mg	11.29	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071714	N05BA06	lorazepam	LORSILAN	tableta	blister, 20 po 2,5 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	161.30	2,5 mg	8.07	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071720	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	70.60	10 mg	15.69	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071721	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	94.50	10 mg	10.50	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071722	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blister, 20 po 6 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	86.50	10 mg	7.21	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071624	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Severna Makedonija	70.60	10 mg	15.69	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071626	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Severna Makedonija	94.50	10 mg	10.50	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071320	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	70.60	10 mg	15.69	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071322	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	94.50	10 mg	10.50	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071324	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	129.80	10 mg	7.21	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071752	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	205.50	1 mg	6.85	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071755	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	49.80	1 mg	6.64	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071756	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 0,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	81.40	1 mg	5.43	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071757	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 1 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	165.20	1 mg	5.51	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071500	N05BA12	alprazolam	MAPRAZAX	tableta	blister, 30 po 1 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	165.20	1 mg	5.51	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077260	N05CD02	nitrazepam	NIPAM	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	63.60	5 mg	6.36	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071461	N05CD08	midazolam	FLORMIDAL	film tableta	blister, 30 po 15 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	884.00	15 mg	29.47	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077301	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	82.70	10 mg	8.27	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077300	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	84.00	10 mg	4.20	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077302	N05CF02	zolpidem	BELBIEN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	84.00	10 mg	4.20	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1077311	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	82.70	10 mg	8.27	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077313	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	84.00	10 mg	4.20	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072740	N06AA04	klomipramin	ANAFRANIL	obložena tableta	30 po 25 mg	Acino Estonia	Estonija	274.80	0,1 g	36.64	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072910	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; S.C. Europharm S.A.	Poljska; Rumunija	251.00	20 mg	8.37	35%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072782	N06AG02	moklobemid	AURORIX	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S	Nemačka; Francuska	1.484.80	0,3 g	49.49	65%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ neuropsihijatra.
1072750	N06AX03	mianserin	TOLVON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	N.V. Organon; Schering-Plough Labo NV	Holandija; Belgija	594.30	60 mg	39.62	65%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072631	N06AX05	trazodon	TRITTICO Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	20 po 150 mg	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.	Italija	509.10	0,3 g	50.91	75%	1. Depresija ( F32 ) 2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i2. na osnovu mišljenja psihijatra/ neuropsihijatra.
1072705	N06AX11	mirtazapin	CALIXTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo d.d.	Hrvatska	287.40	30 mg	9.58	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072861	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	287.40	30 mg	9.58	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072050	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blister, 30 po 30mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	287.40	30 mg	9.58	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072051	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blister, 30 po 45mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	622.00	30 mg	13.82	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089141	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 150 mg	Aspen Bad Oldesloe GmbH	Nemačka	1.055.70	300 mg	70.38	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089140	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 300 mg	Aspen Bad Oldesloe GmbH	Nemačka	1.810.00	300 mg	60.33	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072600	N06AX14	tianeptin	COAXIL	obložena tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	448.50	37,5 mg	44.85	60%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072992	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 75 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	326.20	0,1 g	15.53	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072990	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 150 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	541.20	0,1 g	12.89	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072489	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 37,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	261.30	0,1 g	23.23	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072488	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	349.50	0,1 g	15.53	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072855	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX	tableta	blister, 28 po 37,5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	216.90	0,1 g	20.66	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072856	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX	tableta	blister, 28 po 75 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	326.20	0,1 g	15.53	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072037	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 30 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	448.70	60 mg	32.05	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072036	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 60 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	895.90	60 mg	32.00	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072010	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 30 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	448.70	60 mg	32.05	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072011	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 60 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	895.90	60 mg	32.00	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072012	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.291.10	60 mg	30.74	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072015	N06AX21	duloksetin	DUXET	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 30 mg	Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.	Turska	448.70	60 mg	32.05	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072016	N06AX21	duloksetin	DUXET	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 60 mg	Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.	Turska	895.90	60 mg	32.00	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072870	N06AX22	agomelatin	MELITOR	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Angharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie; Laboratorios Servier S.L.	Pojška; Irska; Francuska; Španija	1.580.00	25 mg	56.43	90%	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072871	N06AX22	agomelatin	MENTELA	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.580.00	25 mg	56.43	90%	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072875	N06AX23	desvenlafaksin	DESEDA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 50 mg	EMS, S.A.	Brazil	1.163.40	50 mg	38.78	85%	1. Depresivna epizoda (F32.1, F32.2, F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.1, F33.2, F33.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079030	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	845.40	7,5 mg	45.29	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079031	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	1.164.00	7,5 mg	31.18	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079051	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	845.40	7,5 mg	45.29	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079050	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.164.00	7,5 mg	31.18	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079041	N06DA02	donepezil	DONECEPT	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd	Malta	845.40	7,5 mg	45.29	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079035	N06DA02	donepezil	DONECEPT	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis Ltd	Malta	1.164.00	7,5 mg	31.18	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088012	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	991.20	9 mg	212.40	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088013	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	991.20	9 mg	106.20	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088014	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	991.20	9 mg	70.80	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088015	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	991.20	9 mg	53.10	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088200	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	991.20	9 mg	212.40	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088201	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	991.20	9 mg	106.20	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088202	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Krka Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	991.20	9 mg	70.80	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088203	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	991.20	9 mg	53.10	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
9088225	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	3.471.10	9 mg	226.38	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
9088226	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	3.471.10	9 mg	109.61	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
908827	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	30 po 13.3mg/24h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GMBH	Švajcarska; Nemačka	3.471.10	9,5 mg	82.65	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079002	N06DA04	galantamin	ALZAMIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 16 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.744.90	16 mg	58.16	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079903	N06DX01	mementin	MEMANDO	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	636.30	20 mg	45.45	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079907	N06DX01	mementin	MEMANDO	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.272.70	20 mg	45.45	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079033	N06DX01	mementin	NEMDATINE	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis LTD	Malta	636.30	20 mg	45.45	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079028	N06DX01	mementin	NEMDATINE	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis LTD	Malta	1.272.70	20 mg	45.45	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079004	N06DX01	mementin	YMANA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1.272.70	20 mg	45.45	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079046	N06DX01	mementin	MEMALIS	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pojlska	636.30	20 mg	45.45	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079047	N06DX01	mementin	MEMALIS	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pojlska	1.272.70	20 mg	45.45	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1075310	N07BB03	akamprosat	CAMPRAL	gastrorezistentna tableta	blister, 84 po 333 mg	Merck S.L; Merck Sante S.A.S	Španija; Francuska	1,121.60	2 g	80.19	90%	Održavanje apstinencije kod pacijenata zavisnih od alkohola u kombinaciji sa psihološkim savetovanjem (F10).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1182031	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE AMOMED	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Wolftratshausen GmbH; Amomed Pharma GmbH	Nemačka; Austrija	3.406.70	50 mg	121.67	75%	Održavanje opijatske zavisnosti (F11).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.
1182051	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	309.50	8 mg	176.86	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspesijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182052	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 8 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	1,037.20	8 mg	148.17	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspesijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182072	N07BC01	buprenorfin	BUPREFEX	sublingvalna tableta	blister, 7 po 2 mg	G.L. Pharma GmbH	Austrija	309.50	8 mg	176.86	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspesijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1182073	N07BC01	buprenorfin	BUPREFEX	sublingvalna tableta	blister, 7 po 8 mg	G.L. Pharma GmbH	Austrija	1.037.20	8 mg	148.17	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182070	N07BC01	buprenorfin	BUPROBOL	sublingvalna tableta	blister, 7 po 2 mg	G.L. Pharma GmbH	Austrija	309.50	8 mg	176.86	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182071	N07BC01	buprenorfin	BUPROBOL	sublingvalna tableta	blister, 7 po 8 mg	G.L. Pharma GmbH	Austrija	1.037.20	8 mg	148.17	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182060	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	sublingvalna tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 7 po (2mg + 0,5mg)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	364.00	8 mg	208.00	45%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182062	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	sublingvalna tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 7 po (8mg + 2mg)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1.251.60	8 mg	178.80	45%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - UKC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - UKC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - UKC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
7110022	R01AD01	beklometazon	BECONASE	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 200 po 50 mcg/doza	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome S.A.	Pojjska; Španija	381.10	0,4 mg	15.24	35%		



Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1.735.50	100 mcg	57.85	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.113.40	24 mcg	74.23	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.744.80	24 mcg	58.16	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114164	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	prašak za inhalaciju	tvrdna kapsula, blister 30 po 150mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2.142.40	0,15mg	71.41	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije.
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	1.718.40	2 inh.	57.28	35%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.249.50	2 inh.	74.98	35%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.846.90	2 inh.	94.90	35%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	1.802.90	2 inh.	60.10	25%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	2.372.40	2 inh.	79.08	25%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114620	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 100mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1.321.80	2 inh.	44.06	25%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114621	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1.802.90	2 inh.	60.10	25%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114622	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	2.372.40	2 inh.	79.08	25%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114677	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+125mcg/doza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	1.802.90	4 inh.	60.10	30%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114678	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/doza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	2.372.40	4 inh.	79.08	30%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4,5mcg/doza+80mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.491.50	4 inh.	99.43	35%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114711	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4,5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.371.10	4 inh.	91.41	35%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114610	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2.742.30	4inh	91.41	35%	1. Bronhijalna astma (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2.848.60	2 inh.	94.95	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114715	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (4,5 mcg/doza + 160 mcg/doza)	AstraZeneca Dunquerque Production Dunquerque	Francuska	2.742.30	4 inh.	91.41	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<60% (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije. Mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114714	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2.616.40	4 inh.	87.21	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114713	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2.848.60	2 inh.	94.95	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114168	R03AK07	formoterol, budesonid	AIRBUFO FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	inhalator, 1 po 60 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Aeropharm GmbH; Salutas Pharma GmbH; Lek Farmaceutska Družba d.d.	Nemačka; Nemačka; Slovenija	1.308.20	4 inh.	87.21	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114246	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (6 mcg/doza + 100 mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	4.664.40	4 inh.	108.10	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114248	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER NEXTHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (6mcg/doza + 100mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	3.242.90	4 inh.	108.10	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.704.30	1 doza	90.14	40%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatornog FEV1.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.492.10	1 doza	116.40	40%	Bronhijalna astma (J45)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114675	R03AL03	vilanterol, umeklidinijum-bromid	ANORO ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg/doza + 55mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.252.40	1 inh.	108.41	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114171	R03AL04	indakaterol, glikopirionijum-bromid	ULTIBRO BREEZHALER	prašak za inhalaciju, kapsula tvrda	blister + inhaler, 30 po (85mcg + 43mcg)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4.108.60	1 inh.	136.95	35%	Terapija održavanja bronhiodilatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhiodilatora (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114008	R03AL05	formoterol, akhidinijum-bromid	BRIMICA GENUAIR	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (12mcg/doza+340mcg/doza)	Industrias Farmaceuticas Almiral S.A	Španija	3.252.40	2 inh.	108.41	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114247	R03AL06	olodaterol, tiotropijum-bromid	SPIOLTO RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2,5mcg/potisak+2,5mcg/potisak)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.Kg	Nemačka	3.983.70	2 inh.	132.79	35%	Terapija održavanja bronhiodilatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhiodilatora (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114689	R03AL08	vilanterol, umeklidinijum-bromid, flutikazonfuroat	TRELEGY ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 30 doza (22mcg + 55 mcg + 92 mcg)	Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	5.282.90	1 inh.	176.10	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatorni FEV1<60% i čija je bolest sklonija pogoršanjima, odnosno koji su u prethodnoj godini imali najmanje dve srednje teške ili najmanje jednu tešku bolnički leženu egzacerbaciju HOBP neinfektivne etiologije, i pored redovne terapije dugodelujućim beta2-agonistom i inhalacionim kortikosteroidom, ili i pored redovne terapije dugodelujućim beta2-agonistom i dugodelujućim antiholinergikom.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114175	R03AL09	formoterol, glikopirionijum-bromid, beklometazon	TRIMBOW	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (5mcg/doza + 9mcg/doza + 87mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	7.177.00	4 inh.	159.49	30%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV <sub>s</sub> 50% i čija je bolest sklona pogoršanjima, odnosno koji su u prethodnoj godini imali najmanje dve srednje teške ili najmanje jednu tešku bolnički lečenu egzacerbaciju HOBP neinfektivne etiologije, i pored redovne terapije dugodelujućim beta2-agonistom i inhalacionim kortikosteroidom, ili i pored redovne terapije dugodelujućim beta2-agonistom i dugodelujućim antiholinergikom.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114177	R03AL11	formoterol, glikopirionijum-bromid, budesonid	TRIXEO AEROSPHERE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozernom, 1 po 120 doza (5 mcg + 7.2 mcg + 160 mcg)	AstraZeneca Dunquerque Production	Francuska	4.719.30	4 inh.	157.31	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatori FEV <sub>s</sub> 60% i čija je bolest sklona pogoršanjima, odnosno koji su u prethodnoj godini imali najmanje dve srednje teške ili najmanje jednu tešku bolnički lečenu egzacerbaciju HOBP neinfektivne etiologije, i pored redovne terapije dugodelujućim beta2-agonistom i inhalacionim kortikosteroidom, ili i pored redovne terapije dugodelujućim beta2-agonistom i dugodelujućim antiholinergikom.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	686.20	800 mcg	27.45	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	699.60	0,6mg	55.97	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1.266.40	0,6mg	50.66	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	1.844.60	0,16 mg	30.74	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	2.566.80	0,16 mg	42.78	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114730	R03BB04	tiotropium-bromid	SPIRIVA	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 18 mcg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	2.442.80	18 mcg	81.43	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114732	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2,5 mcg/potisak)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	2.684.40	5 mcg	89.48	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114734	R03BB04	tiotropijum-bromid	BRALTUS	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	boca plastična, 30 po 10 mcg	Laboratorios Liconsa S.A.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Actavis LTD	Španija; Holandija; Poljska; Malta	1.879.10	10 mcg	62.64	20%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114001	R03BB05	aklidinijum-bromid	BRETARIS GENUAIR	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (322mcg)	Industrias Farmaceuticas Almiral SA	Španija	3.248.00	0,644mg	108.27	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114733	R03BB06	glikopirionijum-bromid	SEEBRI BREEZHALER	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 44mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2.555.10	44mcg	85.17	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114003	R03BB07	umeklidinijum bromid	INCRUSE ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.555.10	55mcg	85.17	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( I, II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	675.80	10 mg	24.14	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	675.80	10 mg	24.14	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	675.80	10 mg	24.14	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1119220	R03DX07	roflumilast	DAXAS	film tableta	blister, 30 po 500 mcg	Takeda GmbH; Corden Pharma GmbH	Nemačka; Nemačka	4.281.30	0,5 mg	142.71	60%	Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške ( I, II ili III stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
3114450	R06AX17	ketotifen	GALITIFEN	sirup	1 po 100 ml (1 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	160.80	2 mg	16.08	50%		Samo za decu stariju od 2 godine.
7090912	S01AE05	levofloksacin	LEXAVON	kapi za oči, rastvor	boca sa kapaljkom, 1 po 5ml (5mg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	486.80	-	-	90%	Bakterijski konjuktivitis (H10.0)	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7090011	S01AE07	moksifloksacin	VIGAMOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	576.00	-	-	90%	Bakterijski konjuktivitis (H10.0)	
7090852	S01AX11	oftoksacin	FLOXAL	kapi za oči, rastvor	plastična bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (3 mg/ml)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	236.20	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16). 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0). 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090851	S01AX11	oftoksacin	FLOXAL	mast za oči	1 po 3 g (3 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	263.70	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16). 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0). 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
7099200	S01BC01	indometacin	INDOCOLLYRE	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (1 mg/ml)	Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH	Francuska; Nemačka	271.40	-	-	75%		
7090813	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	216.50	-	-	50%		
7094070	S01EA05	brimonidin	ALPHAGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	341.20	0,2 ml	13.65	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094080	S01EA05	brimonidin	BRIMONAL 0,2%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	472.40	0,2 ml	9.45	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094071	S01EA05	brimonidin	BRIMODROP	kapi za oči, rastvor	bočica plastična, 1 po 5 ml (2mg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	236.20	0,2 ml	9.45	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096060	S01EC04	brinzolamid	AZOPT	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	462.10	0,2 ml	18.48	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora) 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099086	S01EC54	brinzolamid, brimonidin	SIMBRINZA	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml + 2 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.	Belgija	1.010.00	0,2 ml	40.40	45%	Smanjenje povišenog intraokularnog pritiska (IOP) kod odraslih pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla ili očnom hipertenzijom kod kojih monoterapija ne dovodi do dovoljnog smanjenja IOP (H40).	Lek se uvodi na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099090	S01ED51	timolol, bimatoprost	GANFORT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1.128.80	0,1 ml	37.63	55%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099100	S01ED51	timolol, bimatoprost	GLABRILUX PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5mg/ml + 0,3mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka	790.20	0,1 ml	26.34	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099103	S01ED51	timolol, bimatoprost	BIMADROP PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5mg/ml + 300mcg/ml)	S.C. Rompharm Company S.R.L.	Rumunija	790.20	0,1 ml	26.34	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099180	S01ED51	dorzolamid, timolol	COSOPT	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 5 ml (2% + 0.5%)	Laboratories Merck Sharp & Dohme Chibret-Clermont Ferrand; Santen Oy	Francuska; Finska	403.40	0,2 ml	16.14	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099186	S01ED51	timolol, dorzolamid	COSOPT bez konzervansa	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (5mg/ml + 20mg/ml)	Santen OY	Finska	1.715.60	0,2 ml	34.31	70%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099170	S01ED51	timolol, latanoprost	XALACOM	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom; 1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	562.00	0,1 ml	22.48	30%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099177	S01ED51	timolol, travoprost	DUOTRAV	kapi za oči, rastvor	boca sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1.128.80	0,1ml	45.15	60%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099175	S01ED51	timolol, brinzolamid	AZARGA	kapi za oči, suspenzija	boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1.010.00	0,2 ml	40.40	50%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099188	S01ED51	timolol, brimonidin	COMBIGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml (5mg/ml + 2mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	832.80	0,2 ml	33.31	65%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099145	S01EE03	bimatoprost	LUMIGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	892.20	0,1 ml	29.74	60%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099146	S01EE03	bimatoprost	BIRMOST	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,3mg/ml)	Rafarm SA	Grčka	712.50	0,1 ml	23.75	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099101	S01EE03	bimatoprost	GLABRILUX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,3 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o. Pharmathen SA	Republika Srbija, Grčka	712.50	0,1 ml	23.75	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099102	S01EE03	bimatoprost	BIMADROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)	S.C. Rompharm Company S.R.L.	Rumunija	495.60	0,1 ml	16.52	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099190	S01EE04	travoprost	TRAVATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (40 mcg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cust S.A.	Belgija; Španija	620.80	0,1 ml	24.83	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099195	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)	Laboratoire Unither; Santen Oy	Francuska; Finska	1.524.20	0,1 ml	16.94	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099196	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	bočica plastična, 1 po 3mL (15mcg/mL)	Santen Oy	Finska	1.478.20	0,1 ml	49.27	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090791	S03CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	247.00	-	-	50%		